SNU-81

305638

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare SNU-81 è un modello di carcinoma colorettale umano ottenuto da un paziente coreano. Fa parte di una collezione di 12 linee cellulari di cancro del colon-retto derivate sia da tumori primari che da siti metastatici, fornendo una rappresentazione diversificata della biologia tumorale. SNU-81 deriva da un adenocarcinoma colorettale primario e presenta una morfologia epiteliale con crescita aderente in coltura. La linea cellulare esprime l'antigene carcinoembrionale (CEA), che viene secreto nel surnatante di coltura, riflettendo le caratteristiche tipiche del tumore colorettale.
A livello molecolare, SNU-81 è stata sottoposta a un'ampia caratterizzazione genetica. Presenta una mutazione nel gene soppressore del tumore TP53, un evento comune nella carcinogenesi del colon-retto, tipicamente associato alle fasi più avanzate della progressione del tumore. Inoltre, sono state identificate mutazioni nel gene APC, che implicano un'interruzione della segnalazione di Wnt/β-catenina, un segno distintivo dello sviluppo del cancro colorettale. Non sono state rilevate mutazioni attivanti nel gene K-ras2 per questa linea. Sono state osservate anche alterazioni nei regolatori del ciclo cellulare, come l'ipermetilazione del gene p16, a ulteriore sostegno dell'utilità della linea cellulare per lo studio dei meccanismi genetici ed epigenetici alla base del cancro colorettale. Nel complesso, SNU-81 è un modello in vitro ben definito per esplorare la funzione dei geni soppressori del tumore, la regolazione delle vie oncogeniche e la risposta alle terapie mirate nella ricerca sul cancro colorettale.

Tessuto	Colon
Malattia	Adenocarcinoma

Sinonimi

- SNU81
- NCI-SNU-81

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Aderente
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Simile all'epitelio
Tipo di cellula	Epiteliale
Tempo di raddoppio	30 ore

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

SNU-81 (numero di catalogo Cytion 305638)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_5098

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Profilo mutazionale

Mutazione: APC, semplice, p.Ser1392Ter (c.4175C>A), eterozigote; Mutazione: APC, semplice, p.Arg1450Ter (c.4348C>T), eterozigote; Mutazione: APC, semplice, p.Arg2204Ter (c.6610C>T), eterozigote; Mutazione: FBXW7, semplice, p.Arg479Gln (c.1436G>A), eterozigote; Mutazione: KRAS, semplice, p.Ala146Thr (c.436G>A), eterozigote; Mutazione: PTEN, semplice, p.Arg130Gln (c.389G>A), eterozigote; Mutazione: PTEN, semplice, p.Glu299Ter (c.895G>T), eterozigote; Mutazione: TBX3, semplice, p.Glu111Ter (c.331G>T), eterozigote; Mutazione: TBX3, semplice, c.942-1G>T, eterozigote; Mutazione: TP53, semplice, p.Lys132Thr (c.395A>C), eterozigote; Mutazione: TP53, Semplice, p.Arg213Ter (c.637C>T), Eterozigote

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il terreno di coltura, aggiungere una soluzione fresca di tripsina allo 0,25% e di EDTA allo 0,02%, tenere la fiasca di coltura a 37""C per 3-5 minuti, aggiungere il terreno di coltura e raccogliere le cellule, trasferire il terreno di coltura in una provetta da 15 ml, centrifugare, aspirare il terreno di coltura, risospendere il pellet con il terreno di coltura e versarlo nella fiasca di coltura

Rinnovo dei fluidi	da 2 a 3 volte alla settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	53 anni
Etnia	Coreano

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes