SW-1573

305644

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

SW-1573 je ľudská bunková línia nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) odvodená z pľúcneho tkaniva pacientky s diagnózou skvamocelulárneho karcinómu. Táto bunková línia bola podrobne charakterizovaná z hľadiska jej genetických, biochemických a farmakologických vlastností, čo z nej robí cenný model na štúdium biológie rakoviny pľúc a reakcií na lieky. SW-1573 je známa svojou epitelovou morfológiou a miernou rýchlosťou rastu in vitro. Bol zahrnutý do mnohých štúdií na posúdenie vplyvu chemoterapeutických látok a cielených terapií pri rakovine pľúc.
Genomické analýzy SW-1573 odhalili kľúčové mutácie dôležité pre patogenézu NSCLC. Štúdie ukázali, že SW-1573 nemá bežné riadiace mutácie v KRAS a EGFR, čo ho odlišuje od iných bunkových línií NSCLC, ktoré sa často používajú vo výskume rakoviny pľúc. Namiesto toho nesie iné genomické zmeny, ktoré prispievajú k progresii nádoru a rezistencii na lieky. Rozsiahle farmakogenomické úsilie, ako napríklad úsilie v rámci encyklopédie rakovinových bunkových línií (Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE), hodnotilo jej profil citlivosti na lieky, pričom identifikovalo zraniteľnosť voči špecifickým cytotoxickým látkam a malým molekulovým inhibítorom.
SW-1573 sa využíva v štúdiách radiačnej biológie, pretože vykazuje rôznu citlivosť na ionizujúce žiarenie. Výskumníci použili túto bunkovú líniu na skúmanie mechanizmov reakcie na poškodenie DNA a úlohy kontrolných bodov bunkového cyklu pri liečbe rakoviny pľúc. Štúdie enzýmového polymorfizmu navyše potvrdili jej genetickú stabilitu a odlišnú identitu medzi ostatnými nádorovými bunkovými líniami, čo zabezpečuje jej spoľahlivosť ako výskumného nástroja.

Tkanivo	Pľúca
Choroba	Minimálne invazívny adenokarcinóm, alveolárne bunky

Aplikácie

3D bunkové kultúry, výskum rakoviny

Synonymá

- SW-1573
- SW 1573

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelové
Doba zdvojnásobenia	23 hodín

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

SW-1573 (katalógové číslo Cytion 305644)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1720

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia antigénu

Krvná skupina O, Rh +

Mutčný profil

Vymazanie génu: Delecia génu: CDKN2A, homozygot; .Gene deletion: SMAD4, homozygotný; mutácia: CTNNB1, jednoduchá, p.Ser33Phe (c.98C>T), heterozygotná; mutácia: KRAS, jednoduchá, p.Gly12Cys (c.34G>T), homozygotná; mutácia: KRAS, jednoduchá, p.Gly12Cys (c.34G>T), homozygotná; mutácia: KRAS, jednoduchá, p.Gly12Cys (c.34G>T), homozygotná: PIK3CA, jednoduchá, p.Lys111Glu (c.331A>G), heterozygotná; mutácia: Poznámka: SMARCB1, jednoduchá, c.362+1G>C, heterozygotná, Poznámka = darcovská mutácia (Cosmic-CLP=724878).

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	44 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes