SW-1573

305644

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

SW-1573 är en human cellinje för icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som härrör från lungvävnaden hos en kvinnlig patient som diagnostiserats med skivepitelcancer. Denna cellinje har genomgått omfattande studier av sina genetiska, biokemiska och farmakologiska egenskaper, vilket gör den till en värdefull modell för studier av lungcancers biologi och läkemedelsrespons. SW-1573 är känd för sin epiteliala morfologi och måttliga tillväxthastighet in vitro. Den har ingått i ett stort antal studier för att bedöma effekten av kemoterapeutiska medel och riktade behandlingar vid lungcancer.
Genomiska analyser av SW-1573 har avslöjat viktiga mutationer som är relevanta för patogenesen vid NSCLC. Studier har visat att SW-1573 saknar vanliga drivkraftsmutationer i KRAS och EGFR, vilket skiljer den från andra NSCLC-cellinjer som ofta används inom lungcancerforskningen. Istället bär den på andra genomiska förändringar som bidrar till tumörprogression och läkemedelsresistens. Storskaliga farmakogenomiska studier, som de i Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), har utvärderat cellinjens känslighetsprofil för läkemedel och identifierat sårbarheter för specifika cytotoxiska medel och småmolekylära hämmare.
SW-1573 har använts i strålningsbiologiska studier, eftersom den har uppvisat varierande känslighet för joniserande strålning. Forskare har använt denna cellinje för att undersöka mekanismerna för respons på DNA-skador och cellcykelkontrollpunkternas roll vid behandling av lungcancer. Dessutom har studier av enzympolymorfism bekräftat dess genetiska stabilitet och distinkta identitet bland andra cellinjer som härrör från tumörer, vilket säkerställer dess tillförlitlighet som forskningsverktyg.

Vävnad	Lungan
Sjukdom	Minimalt invasivt adenokarcinom, alveolär cell

Ansökningar

3D-cellodling, Cancerforskning

Synonymer

- SW-1573
- SW 1573

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial
Fördubblingstid	23 timmar

IDENTIFIERARE

Källa

SW-1573 (Cytion katalognummer 305644)

NCBI-skattenummer	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1720

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Antigenuttryck

Blodgrupp O, Rh +

Mutationsprofil

Deletion av gen: CDKN2A, homozygot; .genbortfall: SMAD4, homozygot; Mutation: CTNNB1, enkel, p.Ser33Phe (c.98C>T), heterozygot; Mutation: KRAS, enkel, p.Gly12Cys (c.34G>T), homozygot; Mutation: PIK3CA, enkel, p.Lys111Glu (c.331A>G), heterozygot; Mutation: SMARCB1, Simple, c.362+1G>C, Heterozygot, Not=Splice donor mutation (Cosmic-CLP=724878).

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	44 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes