GL-261-Luc

305662

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

GL261-Luc-celler er et bioluminescerende derivat av den murine GL261-gliomcellelinjen, som er genetisk modifisert til å uttrykke et luciferase-reportergen på en stabil måte. Etter tilførsel av substratet luciferin avgir disse cellene et målbart lyssignal som står i forhold til antallet levedyktige tumorceller, noe som muliggjør følsom og ikke-invasiv overvåking av tumorvekst og behandlingsrespons. GL261-Luc-celler beholder mange av de biologiske og immunogene egenskapene til den opprinnelige GL261-gliom-modellen, inkludert aggressiv vekst og kompatibilitet med syngene immunokompetente musemodeller. Fordi den opprinnelige GL261-linjen stammer fra murint gliom, er GL261-Luc-celler spesielt verdifulle for å studere glioblastombiologi i sammenheng med et intakt immunsystem.
GL261-Luc-celler brukes i stor utstrekning i ortotopiske intrakranielle og subkutane gliom-modeller for longitudinell in vivo-bioluminescensavbildning. Den stabile luciferase-ekspresjonen muliggjør sanntidsvurdering av tumoretablering, progresjon, invasjon, tilbakefall og respons på terapi uten behov for invasive prosedyrer på flere tidspunkter. Disse cellene brukes mye i preklinisk nevroonkologisk forskning for å evaluere kjemoterapi, strålebehandling, immuncheckpoint-blokkering, CAR-T-cellebehandlinger, kreftvaksiner, onkolytiske virus og nanopartikkelbaserte legemiddeladministrasjonssystemer. In vitro er GL261-Luc-celler også egnet for levedyktighetsanalyser, cytotoksisitetsprøver, migrasjons- og invasjonsstudier samt terapeutiske screening-arbeidsflyter med høy gjennomstrømning ved bruk av luminescensbaserte avlesninger.
Som en syngen gliom-modell er GL261-Luc-celler spesielt viktige for å undersøke interaksjoner mellom tumor og immunsystem, nevroinflammasjon og mekanismer for immununnvikelse i glioblastom-mikromiljøet. Imidlertid kan luciferase-vektorsystemer, promotorkonfigurasjoner og seleksjonsstrategier variere mellom uavhengig genererte varianter, noe som potensielt kan påvirke signalintensitet og langsiktig reporterstabilitet. Forskere bør derfor validere luciferaseaktivitet, vekstkinetikk og immunologiske egenskaper under sine spesifikke eksperimentelle forhold før bruk i kvantitative bildediagnostiske studier eller terapeutisk evaluering.

Vev	Hjerne
Sykdom	Glioblastom

KLASSIFISERING

Organisme	Mus
Vekstegenskaper	Tilhenger
GMO-status	GMO-S1

Detaljer om GMO-status

GMO-S1: This cell line contains a stably integrated firefly luciferase reporter cassette (Luc2, codon-optimized) introduced via replication-incompetent lentiviral transduction. The resulting polyclonal cell population was maintained under puromycin selection (1–5 µg/mL). S1 containment is required. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosikkerhetsnivå	1

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

GL-261-Luc (Cytion-katalognummer 305662)

NCBI-skattenummer	10090
Cellosaurus	CVCL_C9CB

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

Luc2 (ildflue, kodonoptimalisert)

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

DMEM, m: 4,5 g/L glukose, m: 4 mM L-glutamin, m: 3,7 g/L NaHCO3, m: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikkelnummer 820300a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Såtetthet	1 til 3 x 10^4 celler/cm^2
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium + 10 % DMSO for å sikre tilstrekkelig levedyktighet etter opptining.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Rase / underart	C57BL/6

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes