HCC827-Luc

305670

GENERAL INFORMATION

Description

HCC827-Luc □□□ HCC827 □□□ □□ HCC827 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EGFR □ 19 □□□□□□del E746-A750□□□□□□□□□ EGFR □□□□□□□□□□TKIs□——□□□□□□□ □□□□□□□□□□□EGFR□□□□□□□□□□TKIs□□□□□□□□□□□□□□HCC827□□□EGFR□□□□□□□□□□□□□□TKI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640□□ 2.0 mM □□□□□□□□ 2.0 g/L $NaHCO_3$□Cytion □□□□ 820700a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% □□□□□□FBS□

Dissociation reagent	Accutase□□ 37°C □□□ 10 □□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Warranty

□ Cytion□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
60 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□

Material Transfer Agreement required	Yes