Neuro-2a-Luc

305690

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Neuro-2a-Luc er et luciferase-uttrykkende derivat av musens nevroblastomcellelinje Neuro-2a (N2a). Neuro-2a-celler stammer fra nevroblastomvev avledet fra musens nevralrille og brukes mye som in vitro-modell for nevronaldifferensiering, studier av nevrotoksisitet, forskning på signaltransduksjon og nevroonkologiske undersøkelser. Stabil ekspresjon av en luciferase-reporter muliggjør sensitiv, kvantitativ bioluminescerende deteksjon av levedyktige celler og cellulær aktivitet, noe som gjør Neuro-2a-Luc spesielt nyttig for longitudinell overvåking i både in vitro- og in vivo-eksperimentelle systemer. Avhengig av reporterdesignet kan luciferase-ekspresjonen være konstitutiv eller knyttet til signalveispesifikk promotoraktivitet.
Neuro-2a-Luc-celler brukes ofte i applikasjoner som involverer sporing av tumorvekst, høykapasitets screening av legemidler, nevrale differensieringsassayer og sanntidsvurdering av terapeutiske responser. I xenotransplantasjons- og metastasemodeller tillater luciferase-basert bioluminescensavbildning ikke-invasiv overvåking av tumorbyrde og sykdomsprogresjon med høy følsomhet. Neuro-2a-avledede systemer brukes også i stor utstrekning til å studere nevronmorfologi, nevrittutvekst, apoptose, oksidativt stress og mekanismer assosiert med nevrodegenerative sykdommer. Luciferasemodifikasjonen muliggjør rask kvantitativ analyse av celleproliferasjon, cytotoksisitet, transkripsjonsaktivitet eller signalveismodulering som respons på farmakologiske eller genetiske forstyrrelser.
Som med andre konstruerte reportercellelinjer, kan den eksperimentelle ytelsen til Neuro-2a-Luc avhenge av faktorer som integrasjonsstedet for luciferasekonstruktet, promotorkonfigurasjonen, substratkompatibiliteten og stabiliteten i reporteruttrykket over flere passasjer. Ytterligere karakteriseringsdata, inkludert detaljer om luciferasevarianten, seleksjonsmarkøren og valideringsassayer, kan være nødvendig for høyt spesialiserte eksperimentelle anvendelser.

Vev	Det perifere nervesystemet
Sykdom	Nevroblastom

Synonymer

- Neuro2A-Luc

KLASSIFISERING

Organisme	Mus
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
GMO-status	GMO-S1

Detaljer om GMO-status

GMO-S1: This cell line contains a stably integrated firefly luciferase reporter cassette (Luc2, codon-optimized) introduced via replication-incompetent lentiviral transduction. The resulting polyclonal cell population was maintained under puromycin selection (1–5 µg/mL). S1 containment is required. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Celletype	Nevronale og amøboide stamceller

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Neuro-2a-Luc (Cytion-katalognummer 305690)

NCBI-skattenummer	10090
Cellosaurus	CVCL_K046

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

Luc2 (ildflue, kodonoptimalisert)

Virus

Ektromelavirus (musekopper): negativ

Virusresistens

Poliovirus 1

Revers transkriptase	Negativ

Produkter

Tubulin, acetylkolinesterase

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), m: 2 mM L-Glutamin, m: 2,2 g/L NaHCO3, m: EBSS (Cytion artikkelnummer 820100a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS og 1 % NEAA

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Såtetthet	1 til 3 × 10^4 celler/cm^2
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium + 10 % DMSO for å sikre tilstrekkelig levedyktighet etter opptining.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes