Panc02-Luc

305706

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Panc02-Luc es un derivado de la línea celular Panc02 de adenocarcinoma pancreático murino que expresa luciferasa. Las células Panc02 proceden de un adenocarcinoma ductal pancreático inducido químicamente en ratones y se utilizan ampliamente como modelo singénico de cáncer de páncreas en huéspedes murinos inmunocompetentes. La introducción de un reportero de luciferasa permite obtener imágenes bioluminiscentes de alta sensibilidad de las células tumorales in vitro e in vivo, lo que facilita el seguimiento longitudinal no invasivo del crecimiento tumoral, la diseminación metastásica y la respuesta terapéutica. Estas propiedades convierten a Panc02-Luc en una valiosa plataforma para estudios de biología del cáncer de páncreas, inmuno-oncología y desarrollo preclínico de fármacos.
Las células Panc02-Luc se utilizan habitualmente en modelos tumorales ortotópicos y subcutáneos en ratones para investigar la progresión tumoral, las interacciones estromales, la infiltración de células inmunitarias y los mecanismos de resistencia a la quimioterapia o la inmunoterapia. Dado que los tumores Panc02 pueden establecerse en cepas de ratones singénicos con un sistema inmunitario intacto, el modelo resulta especialmente útil para evaluar inhibidores de puntos de control, terapias celulares adoptivas, vacunas contra el cáncer y estrategias de tratamiento combinado. La obtención de imágenes basada en luciferasa permite la evaluación cuantitativa repetida de la carga tumoral en animales vivos, lo que reduce la variabilidad experimental y permite la evaluación en tiempo real de la eficacia del tratamiento.
Las células Panc02-Luc se utilizan para estudios sobre la proliferación, migración, invasión, señalización de citocinas, adaptación metabólica y apoptosis de las células tumorales pancreáticas. El comportamiento biológico del modelo puede variar en función del constructo de luciferasa, el sistema promotor y la estrategia de selección clonal utilizados durante la ingeniería. Otros datos de caracterización, como la estabilidad del reportero, la intensidad de la luminiscencia y el potencial metastásico, pueden ser importantes para aplicaciones experimentales especializadas.

Pañuelo de papel	Páncreas
Enfermedad	Adenocarcinoma ductal pancreático en ratón

Sinónimos

- Luciferase Reporter Panc02 Cell Line

CLASIFICACIÓN

Organismo	Ratón
Sexo	Hombre
Propiedades de crecimiento	Adherente
Situación respecto a los OMG	GMO-S1

Detalles sobre la presencia de OMG

GMO-S1: This cell line contains a stably integrated firefly luciferase reporter cassette (Luc2, codon-optimized) introduced via replication-incompetent lentiviral transduction. The resulting polyclonal cell population was maintained under puromycin selection (1–5 µg/mL). S1 containment is required. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Nivel de bioseguridad	1

CARACTERÍSTICAS

Tiempo de duplicación	24-48 horas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICADORES

Referencia

Panc02-Luc (número de catálogo de Cytion 305706)

N.º de identificación fiscal del NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_E3IB

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Expresión de antígenos

Luc2 (luciérnaga, optimizada por codones)

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

RPMI 1640, con: 2,0 mM de glutamina estable, con: 2,0 g/L de NaHCO3 (número de artículo de Cytion 820700a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Complementar el medio con un 10% de FBS

Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Densidad de siembra	De 1 a 3 x 10^4 células/cm^2
Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos medio de crecimiento completo + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Raza / subespecie	C57BL/6
Edad del donante	Sin especificar

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes