Panc02-Luc

305706

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

Panc02-Luc on Panc02 hiire pankrease adenokartsinoomi rakuliini lucifereesi ekspresseeriv derivaat. Panc02 rakud pärinevad hiirtel keemiliselt indutseeritud pankrease duktaalse adenokartsinoomi rakkudest ja neid kasutatakse laialdaselt pankreasevähi süngeense mudelina immuunkompetentsetes hiirte peremeesorganismides. Lutsiferaasi reportergeeni sisseviimine võimaldab kasvajarakkude väga tundlikku bioluminestsentskuvamist in vitro ja in vivo, hõlbustades kasvaja kasvu, metastaaside leviku ja ravivastuse mitteinvasiivset pikaajalist jälgimist. Need omadused teevad Panc02-Lucist väärtusliku platvormi pankreasevähi bioloogia, immuno-onkoloogia ja ravimite prekliiniliste arendusuuringute jaoks.
Panc02-Luc rakke kasutatakse tavaliselt ortotopilistes ja subkutaansetes hiire kasvajamudelites, et uurida kasvaja progresseerumist, strooma interaktsioone, immuunrakkude infiltratsiooni ning kemoteraapia või immunoteraapia resistentsuse mehhanisme. Kuna Panc02 kasvajaid on võimalik tekitada süngeneetsetes hiiretõugudes, millel on terviklik immuunsüsteem, on mudel eriti kasulik kontrollpunkti inhibiitorite, adoptiivse rakuteraapia, vähivaktsiinide ja kombinatsioonravi strateegiate hindamiseks. Lutsiferaasil põhinev pildistamine võimaldab elusloomadel korduvalt kvantitatiivselt hinnata kasvajakoormust, vähendades eksperimentaalseid kõikumisi ja toetades ravi tõhususe hindamist reaalajas.
Panc02-Luc rakke kasutatakse pankrease kasvajarakkude proliferatsiooni, migratsiooni, invasiivsuse, tsütokiinide signaalimise, metaboolse adaptsiooni ja apoptoosi uuringutes. Mudeli bioloogiline käitumine võib varieeruda sõltuvalt lucifereasi konstruktist, promootorisüsteemist ja kloonide valiku strateegiast, mida kasutatakse modifitseerimisel. Täiendavad iseloomustavad andmed, sealhulgas reportergeeni stabiilsus, luminestsentsi intensiivsus ja metastaatilise potentsiaali, võivad olla olulised spetsialiseeritud eksperimentaalsete rakenduste jaoks.

Kude	Pankreas
Haigus	Hiirte kõhunäärme ductuse adenokartsinoom

Sünonüümid

- Luciferase Reporter Panc02 Cell Line

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Hiir
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Järgija
GMO-staatus	GMO-S1

GMO-staatuse üksikasjad

GMO-S1: This cell line contains a stably integrated firefly luciferase reporter cassette (Luc2, codon-optimized) introduced via replication-incompetent lentiviral transduction. The resulting polyclonal cell population was maintained under puromycin selection (1–5 µg/mL). S1 containment is required. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Kahekordistumisaeg	24–48 tundi

TUNNUSED

Viide

Panc02-Luc (Cytioni kataloginumber 305706)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI maksukood	10090
Cellosaurus	CVCL_E3IB

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Antigeeni ekspressioon

Luc2 (tulikärbes, kodonoptimeeritud)

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase

Kultuuri edasikasvatamine

Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifuugige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.

Külvitihedus	1 kuni 3 x 10^4 rakku/cm^2
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikuna kasutame täielikku kasvukeskkonda + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Tõug / alamliik	C57BL/6
Doonori vanus	Täpsustamata

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""'x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes