# UM-HMC-3B

305715

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

### Описание

UM-HMC-3B е клетъчна линия на човешки мукоепидермоиден карцином, получена от първичен мукоепидермоиден карцином на слюнчените жлези на твърдото небце при 73-годишна пациентка от кавказката раса. Клетъчната линия е част от панела на Университета на Мичиган за човешки мукоепидермоиден карцином (UM-HMC). Подобно на UM-HMC-1, UM-HMC-3B притежава генната фузия CRTC1-MAML2 (MECT1-MAML2) – онкогенния фактор, отговорен за развитието на по-голямата част от мукоепидермоидните карциноми, която е резултат от(11;19)(q21;p13) и води до активиране на CREB и Notch пътеките.
UM-HMC-3B е подходящ за изследвания на биологията на мукоепидермоидните карциноми на твърдото небце и слюнчените жлези, на CRTC1-MAML2 сигнализацията, както и за сравнителни анализи с други линии от панела UM-HMC. Заедно с UM-HMC-1 и други членове на панела, UM-HMC-3B позволява идентифицирането на общи и различаващи се молекулярни характеристики при мукоепидермоидни карциноми от различни анатомични локализации, възрасти и полове. Той е подходящ и за тестове за лекарствена чувствителност, насочени към онкопротеини от сливане и надолу по веригата ефектори на CREB/Notch.

| | |
|---|---|
| **Тъкан** | Твърдо небце, слюнчена жлеза |
| **Заболяване** | Мукоепидермоиден карцином на твърдото небце |
| **Място на метастазите** | Място на първичния тумор (твърдото небце) |

### Приложения

Изследвания върху карцинома на слюнчените жлези; биология на CRTC1-MAML2-фузията; биология на MEC на твърдото небце; CREB/Notch-пътеката; сравнителни панелни проучвания на UM-HMC; тестове за лекарствена чувствителност

### Синоними

- University of Michigan-Human Mucoepidermoid Carcinoma-3B

## КЛАСИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Организъм** | Човек |
| **Секс** | Женски |
| **Свойства, свързани с растежа** | Привърженик |
| **Статус на ГМО** | Без ГМО |

### Подробности относно статуса на ГМО

No genetic modification; somatic CRTC1-MAML2 fusion acquired during tumor development

| | |
|---|---|
| **Ниво на биологична безопасност** | 1 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Морфология** | Подобни на епител |
| **Тип клетка** | Епителни клетки |
| **Време за удвояване** | приблизително 24 до 48 часа |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## ИДЕНТИФИКАТОРИ

**Източник**

UM-HMC-3B (каталожен номер на Cytion: 305715)

| | |
|---|---|
| **Данъчен идентификационен номер в NCBI** | 9606 |
| **Целозавър** | CVCL_Y472 |

## ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

**Мутационен профил**

Мутация: Генна фузия, CRTC1 + HGNC, MAML2, Име(на)=CRTC1-MAML2, MECT1-MAML2.

## ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

**Хранителна среда**

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L глюкоза, w: 2,5 mM L-глутамин, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM натриев пируват, w: 1,2 g/L NaHCO3 (номер на изделието на Cytion 820400a)

| | |
|---|---|
| **Атмосфера за инкубация** | 37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера. |

**Добавки**

Допълнете средата с 10% FBS

| | |
|---|---|
| **Реагент за дисоциация** | Accutase |

**Пресаждане**

Отстранете средата, измийте с PBS без калций и магнезий, покрийте с Accutase, инкубирайте 8–10 минути при стайна температура, ресуспендирайте в средата, центрофугирайте при 300×g в продължение на 3 минути, изхвърлете супернатантата и презасейте в свежа среда.

| | |
|---|---|
| **Коефициент на разделяне** | от 1 до 5 |
| **Плътност на засяването** | 2–4 × $10^4$/см² |
| **Обновяване на течността** | На всеки 2 до 3 дни |

**Размразяване и култивиране**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

### Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

| | |
|---|---|
| **Среда за замразяване** | Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес. |

### Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

### Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

## ДАРИТЕЛ

| | |
|---|---|
| **Възраст на донора** | 73 години |
| **Етническа принадлежност** | Кавказки |

## ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

### Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

### Отказ от отговорност

Нашите клетки се предоставят изключително за целите на лабораторни изследвания in vitro и не са предназначени за клинична или диагностична употреба, нито да се прилагат на хора или да се използват за ветеринарни цели. Потребителите трябва да се придържат към всички приложими насоки и разпоредби за боравене и използване на тези клетки в изследователска среда.

### Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

| | |
|---|---|
| **Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали** | Yes |