UM-HMC-3A

305717

معلومات عامة

الوصف

هو خط خلوي لسرطان الغشاء المخاطي-الجلدي البشري، تم إنشاؤه من تكرار محلي لورم في الغدة اللعابية لدى مريض بالغ، بعد عدة UM-HMC-3A المستمدة من نفس الشخص، (UM-HMC-3A و UM-HMC-3B) سنوات من الاستئصال الجراحي للآفة الأولية. وهو جزء من زوج متطابق من الخطوط الخلوية شكلاً مستقراً شبيهاً بالأنسجة UM-HMC-3A وتمثل مراحل متميزة من تطور المرض، وهي التكرار المحلي وانتشار الورم إلى العقد الليمفاوية. تُظهر خلايا الظهارية في المختبر، حيث تشكل طبقات أحادية تشبه الحصى وتحافظ على خصائص نمو متسقة خلال فترة استزراع طويلة، مع الإبلاغ عن تكاثر ناجح لأكثر أصلها من ورم المريض ويستبعد التلوث المتبادل، مما يدعم موثوقيتها كنظام نموذجي (STR) من 100 دورة. ويؤكد تحليل التكرار الترادفي القصير.
قدرة على تكوين الأورام في الجسم الحي، حيث تشكل أورامًا مزروعة عند زرعها في فئران تعاني من نقص المناعة. تكرر هذه الأورام UM-HMC-3A تُظهر المزروعة السمات النسيجية المرضية الرئيسية للورم الأصلي للمريض، بما في ذلك وجود مجموعات خلوية شبيهة بالبشرة ومُنتجة للموسين. يكشف تلطيخ عن إنتاج عديد السكاريد المخاطي الذي يماثل الأورام البشرية، مما يشير إلى الحفاظ على التمايز الوظيفي. بالمقارنة مع نظيره (PAS) حمض شيف الدوري عادةً تكوينًا أبطأ للورم وتأقلمًا أوليًا أقل اتساقًا، مما يعكس الاختلافات البيولوجية المرتبطة بالتكرار الموضعي UM-HMC-3A يُظهر، (UM-HMC-3B) المنتشر نموذجًا قيمًا ومميزًا جيدًا لدراسة تكرار الورم، والتمايز الظهاري، والاستجابات العلاجية في سرطان الغدد اللعابية UM-HMC-3A مقابل التقدم المنتشر. يوفر المخاطي-الظهاري.

الأنسجة	تجويف الفم، الحنك الصلب
المرض	سرطان الغشاء المخاطي الجلدي في الحنك الصلب

المرادفات

- University of Michigan-Human Mucoepidermoid Carcinoma-3A

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	أنثى
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

المعرّفات

المرجع

UM-HMC-3A (رقم كتالوج Cytion 305717)

NCBI رقم التعريف الضريبي لدى	9606
سيلوصور	CVCL_Y471

التعبير والقابلية للإصابة

الأنماط الطفريّة

التحور: اندماج الجينات، CRTC1 + HGNC، MAML2، (الأسماء) الاسم = CRTC1-MAML2، MECT1-MAML2.

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

DMEM: DMEM:Ham's F12 (1:1)، ملي 0.5 :ث، ملي مولار هيبيس (15 :ث، ملي مولار جلوتامين، 2.5 :ث، جم/لتر جلوكوز، 3.1 :ث
(رقم المادة 820400) NaHCO3 مولار بيروفات الصوديوم، ث: 1.2 ملي مولار/لتر

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

بيئة الحضانة	درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب 37.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	سنة 73
الأصل العرقي	قوقازي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

إخلاء المسؤولية

يتم توفير خلايانا لأغراض الأبحاث المختبرية في المختبر حصرياً وليست مخصصة للاستخدام السريري أو التشخيصي، ولا يتم إعطاؤها للبشر أو استخدامها للأغراض البيطرية. يجب على المستخدمين الالتزام بجميع الإرشادات واللوائح المعمول بها للتعامل مع هذه الخلايا واستخدامها في بيئة بحثية.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes