UM-HMC-3A

305717

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

UM-HMC-3A è una linea cellulare di carcinoma mucoepidermoide umano ottenuta dalla recidiva locale di un tumore delle ghiandole salivari in un paziente adulto, diversi anni dopo la resezione chirurgica della lesione primaria. Fa parte di una coppia di linee cellulari correlate (UM-HMC-3A e UM-HMC-3B) derivate dallo stesso individuo, che rappresentano stadi distinti della progressione della malattia, ovvero la recidiva locale e la metastasi linfonodale. Le cellule UM-HMC-3A mostrano una morfologia stabile di tipo epiteliale in vitro, formando monostrati simili a ciottoli e mantenendo caratteristiche di crescita costanti durante la coltura prolungata, con una propagazione riuscita riportata oltre i 100 passaggi. Il profilo delle ripetizioni in tandem corte conferma la loro origine dal tumore del paziente ed esclude la contaminazione incrociata, a sostegno della loro affidabilità come sistema modello.
UM-HMC-3A dimostra capacità tumorigenica in vivo, formando tumori da xenotrapianto quando impiantata in topi immunodeficienti. Questi xenotrapianti riproducono le caratteristiche istopatologiche chiave del tumore originale del paziente, inclusa la presenza di popolazioni cellulari sia di tipo epidermoide che produttrici di mucina. La colorazione con acido periodico-Schiff (PAS) rivela una produzione di mucopolisaccaridi paragonabile a quella dei tumori umani, indicando una differenziazione funzionale preservata. Rispetto alla sua controparte metastatica (UM-HMC-3B), l'UM-HMC-3A mostra tipicamente una formazione tumorale più lenta e un attecchimento iniziale meno consistente, riflettendo le differenze biologiche associate alla recidiva locale rispetto alla progressione metastatica. L'UM-HMC-3A fornisce un modello prezioso e ben caratterizzato per lo studio della recidiva tumorale, della differenziazione epiteliale e delle risposte terapeutiche nel carcinoma mucoepidermoide delle ghiandole salivari.

Tessuto	Cavità orale, palato duro
Malattia	Carcinoma mucoepidermoide del palato duro

Sinonimi

- University of Michigan-Human Mucoepidermoid Carcinoma-3A

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Aderente
Livello di biosicurezza	1

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

UM-HMC-3A (numero di catalogo Cytion 305717)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_Y471

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Profilo mutazionale

Mutazione: fusione genica, CRTC1 + HGNC, MAML2, nome/i = CRTC1-MAML2, MECT1-MAML2.

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L di glucosio, w: 2,5 mM di L-Glutammina, w: 15 mM di HEPES, w: 0,5 mM di Sodio piruvato, w: 1,2 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820400a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Reagente di dissociazione	Accutase

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	73 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Dichiarazione di non responsabilità

Le nostre cellule sono fornite esclusivamente per scopi di ricerca di laboratorio in vitro e non sono destinate all'uso clinico o diagnostico, né devono essere somministrate all'uomo o utilizzate per scopi veterinari. Gli utenti devono attenersi a tutte le linee guida e le normative applicabili per la manipolazione e l'uso di queste cellule in un contesto di ricerca.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB