UM-HMC-3A

305717

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

UM-HMC-3A er en humant mukoepidermoid karsinomcellelinje som er etablert fra et lokalt tilbakefall av en spyttkjertelsvulst hos en voksen pasient, flere år etter kirurgisk fjerning av den primære lesjonen. Den inngår i et par av cellelinjer (UM-HMC-3A og UM-HMC-3B) som stammer fra samme person, og som representerer ulike stadier av sykdomsutviklingen, nemlig lokalt tilbakefall og lymfeknute-metastaser. UM-HMC-3A-celler viser en stabil epitelignende morfologi in vitro, danner brosteinslignende monolag og opprettholder konsistente vekstegenskaper over lengre tid i kultur, med rapportert vellykket forplantning utover 100 passasjer. Profilering av korte tandemrepeter bekrefter deres opprinnelse fra pasientens svulst og utelukker krysskontaminering, noe som underbygger deres pålitelighet som modellsystem.
UM-HMC-3A viser tumorigenisk kapasitet in vivo og danner xenotransplantat-tumorer når de implanteres i immunsvake mus. Disse xenotransplantatene gjenspeiler viktige histopatologiske trekk ved den opprinnelige pasienttumoren, inkludert tilstedeværelsen av både epidermoidlignende og mucinproduserende cellepopulasjoner. Periodic Acid–Schiff (PAS)-farging avslører mucopolysakkaridproduksjon som kan sammenlignes med humane tumorer, noe som indikerer bevart funksjonell differensiering. Sammenlignet med sin metastatiske motpart (UM-HMC-3B) viser UM-HMC-3A typisk langsommere tumordannelse og mindre konsistent innledende engraftment, noe som gjenspeiler biologiske forskjeller knyttet til lokalt tilbakefall kontra metastatisk progresjon. UM-HMC-3A gir en verdifull, godt karakterisert modell for å undersøke tumortilbakefall, epitelial differensiering og terapeutiske responser ved mukoepidermoid karsinom i spyttkjertlene.

Vev	Munnhule, hard gane
Sykdom	Mukoepidermoid karsinom i hard gane

Synonymer

- University of Michigan-Human Mucoepidermoid Carcinoma-3A

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Kvinne
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

UM-HMC-3A (Cytion katalognummer 305717)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_Y471

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

Mutasjon: Genfusjon, CRTC1 + HGNC, MAML2, Navn(er)=CRTC1-MAML2, MECT1-MAML2.

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukose, w: 2,5 mM L-glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820400a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	73 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Ansvarsfraskrivelse

Cellene våre leveres utelukkende til in vitro-laboratorieforskningsformål og er ikke ment for klinisk eller diagnostisk bruk, og de skal heller ikke administreres til mennesker eller brukes til veterinærformål. Brukere må overholde alle gjeldende retningslinjer og forskrifter for håndtering og bruk av disse cellene i forskningssammenheng.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB