UM-HMC-3A

305717

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

UM-HMC-3A je bunková línia ľudského mukoepidermoidného karcinómu, ktorá bola izolovaná z lokálnej recidívy nádoru slinných žliaz u dospelého pacienta, niekoľko rokov po chirurgickej resekcii primárneho ložiska. Je súčasťou páru zhodných bunkových línií (UM-HMC-3A a UM-HMC-3B) odvodených od toho istého jedinca, ktoré reprezentujú odlišné štádiá progresie ochorenia, a to lokálnu recidívu a metastázy do lymfatických uzlín. Bunky UM-HMC-3A vykazujú in vitro stabilnú epiteliálnu morfológiu, vytvárajú monovrstvy podobné dlažobným kockám a zachovávajú konzistentné rastové charakteristiky počas dlhodobej kultivácie, pričom bolo zaznamenané úspešné rozmnožovanie aj po viac ako 100 pasážach. Profilovanie krátkych tandemových opakovaní potvrdzuje ich pôvod z nádoru pacienta a vylučuje krížovú kontamináciu, čo podporuje ich spoľahlivosť ako modelového systému.
UM-HMC-3A vykazuje tumorigenickú schopnosť in vivo a pri implantácii do imunodeficientných myší vytvára xenotransplantátové nádory. Tieto xenotransplantáty reprodukujú kľúčové histopatologické charakteristiky pôvodného nádoru pacienta, vrátane prítomnosti populácií buniek podobných epidermoidným bunkám aj buniek produkujúcich mucín. Farbenie Periodic Acid–Schiff (PAS) odhaľuje produkciu mukopolysacharidov porovnateľnú s ľudskými nádormi, čo naznačuje zachovanú funkčnú diferenciáciu. V porovnaní so svojím metastatickým náprotivkom (UM-HMC-3B) vykazuje UM-HMC-3A typicky pomalšiu tvorbu nádoru a menej konzistentné počiatočné prihojenie, čo odráža biologické rozdiely spojené s lokálnou recidívou oproti metastatickému progresu. UM-HMC-3A poskytuje cenný, dobre charakterizovaný model na skúmanie recidívy nádoru, epitelovej diferenciácie a terapeutických odpovedí pri mukoepidermoidnom karcinóme slinných žliaz.

Tkanivo	Ústna dutina, tvrdé podnebie
Choroba	Mukoepidermoidný karcinóm tvrdého patra

Synonymá

- University of Michigan-Human Mucoepidermoid Carcinoma-3A

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

UM-HMC-3A (číslo katalógu Cytion 305717)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_Y471

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Mutčný profil

Mutácia: Fúzia génov, CRTC1 + HGNC, MAML2, Názov(-y)=CRTC1-MAML2, MECT1-MAML2.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glukózy, w: 2,5 mM L-glutamínu, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM pyruvátu sodného, w: 1,2 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820400a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	73 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Upozornenie

Naše bunky sa poskytujú výlučne na účely laboratórneho výskumu in vitro a nie sú určené na klinické alebo diagnostické použitie, ani sa nemajú podávať ľuďom alebo používať na veterinárne účely. Používatelia musia dodržiavať všetky platné smernice a predpisy pre manipuláciu a používanie týchto buniek vo výskumnom prostredí.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB