MCA-205

305730

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

MCA-205 je myšia fibrosarkómová bunková línia odvodená z myší C57BL/6. Pôvodne bola vytvorená prostredníctvom tumorigenézy indukovanej metylcholantrénom, klasickým chemickým karcinogénnym prístupom široko používaným na vytvorenie transplantovateľných nádorových modelov u syngénnych myší. MCA-205 slúži ako imunokompetentný nádorový model, čo znamená, že môže byť implantovaný do imunokompetentných myší C57BL/6 bez odmietnutia, čo ho robí vysoko vhodným pre predklinické štúdie imunoterapie rakoviny a nádorovej imunológie.
Z biologického hľadiska sú nádory MCA-205 klasifikované ako neimunogénne alebo slabo imunogénne, čo odráža ich nízku základnú antigenitu a zníženú náchylnosť na spontánne imunitné odmietnutie. Táto vlastnosť je obzvlášť užitočná pri hodnotení účinnosti terapií blokádou kontrolných bodov (ako sú anti-PD-1 alebo anti-CTLA-4) alebo nádorových vakcín v podmienkach, ktoré odrážajú imunologickú povahu mnohých ľudských rakovín. Napriek svojej nízkej vnútornej imunogenite môžu nádory MCA-205 reagovať na imunomoduláciu v kombinácii s rádioterapiou, onkolytickými vírusmi alebo agonistami TLR, čo z nich robí univerzálnu platformu pre testovanie kombinovanej liečby.
Bunky MCA-205 rýchlo rastú in vitro aj in vivo a pri subkutánnej injekcii tvoria agresívne fibrosarkómy. Tieto nádory majú vysoký stupeň vaskularizácie a podporujú reprodukovateľnú kinetiku rastu nádoru, čo umožňuje konzistentné meranie nádorovej záťaže a reakcie na liečbu. Vzhľadom na svoj myší pôvod a syngenitu s myšami C57BL/6 nie sú bunky MCA-205 vhodné pre testy špecifické pre človeka, ale sú nevyhnutné pre skúmanie imunitných mechanizmov v plne funkčnom imunitnom systéme hostiteľa.

Choroba	Fibrosarkóm myši

Synonymá

- MCA 205
- MCA205

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Myš
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

MCA-205 (číslo katalógu Cytion 305730)

Daňové identifikačné číslo NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_VR90

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO_2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10% FBS a 1% NEAA

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Upozornenie

Naše bunky sa poskytujú výlučne na účely laboratórneho výskumu in vitro a nie sú určené na klinické alebo diagnostické použitie, ani sa nemajú podávať ľuďom alebo používať na veterinárne účely. Používatelia musia dodržiavať všetky platné smernice a predpisy pre manipuláciu a používanie týchto buniek vo výskumnom prostredí.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes