BFTC-905

305749

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія BFTC-905 — це модель перехідноклітинної карциноми (TCC) людини, отримана з високодиференційованої папілярної пухлини сечового міхура у пацієнтки. Вона була створена для моделювання агресивного раку сечового міхура і використовується в дослідженнях цитогенетичного та молекулярного профілювання з метою вивчення біології пухлин сечового міхура та їх терапевтичної вразливості. BFTC-905 демонструє надзвичайно складний та реорганізований каріотип, що включає численні хромосомні аномалії, типові для запущених форм раку сечового міхура. До них належать невипадкові зміни, такі як делеції 8p, дуплікації 8q та надлишки в хромосомах 7 та 20 — ознаки, що часто пов'язані з прогресуванням захворювання та несприятливим прогнозом при уротеліальній карциномі.

Всебічна характеристика за допомогою багатоколірної флуоресцентної гібридизації in situ (M-FISH) виявила численні структурні перебудови в BFTC-905, включаючи міжхромосомні транслокації та делеції, що впливають на локуси з потенційним значенням для втрати супресорних генів пухлини. Зокрема, BFTC-905 демонструє делецію хромосоми 8p21 — ділянки, яка часто втрачається в агресивному ТКК та пов'язана з генами-супресорами пухлин. Ця цитогенетична складність надає цінну можливість для аналізу функції генів у контексті геномної нестабільності — характерної ознаки раку сечового міхура на пізніх стадіях.

BFTC-905 також було включено до масштабних фармакогеномних досліджень, таких як Енциклопедія клітинних ліній раку (CCLE) та Геноміка чутливості до ліків при раку (GDSC). Ці ресурси підтвердили молекулярну відповідність BFTC-905 первинним пухлинам сечового міхура та дозволили використовувати його в прогнозному моделюванні реакції на протиракові препарати. Його мультиомічний профіль, що включає експресію генів, статус мутацій, варіації кількості копій та метилювання ДНК, робить його потужною моделлю для дослідження специфічних для раку сечового міхура терапевтичних мішеней та механізмів резистентності.

Тканина	Сечовий міхур
Хвороба	Карцинома сечового міхура

Синоніми

- BFTC 905
- BFTC905
- Black Foot disease Transitional Carcinoma 905

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальний
Тип клітини	Епітеліальний
Час подвоєння	60–70 годин

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

BFTC-905 (номер у каталозі Cytion 305749)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1083

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Ізоферменти

G6PD; MD; LD

Профіль мутацій

Мутація: NRAS, проста, p.Gln61Leu (c.182A>T), гетерозиготна (Cosmic-CLP=910926), TP53, проста, c.673-2A>T (IVS6-2A>T), гомозиготна, примітка = мутація-акцептор сплайсингу (Cosmic-CLP=910926)

Віруси

Результат тесту на зворотну транскриптазу негативний; ПЛР: ЕБВ —, ВГВ —, ВГС —, ВГВ-8 —, ВІЛ-1 —, ВІЛ-2 —, ВТЛВ-1/2 —, МЛВ —, СМРВ —

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	Від 1 до 3 x 10^4 клітин/см2
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	51 рік
Етнічна приналежність	Китайська

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Застереження

Наші клітини призначені виключно для лабораторних досліджень in vitro і не призначені для клінічного або діагностичного використання, а також не можуть бути введені людям або використані у ветеринарних цілях. Користувачі повинні дотримуватися всіх застосовних інструкцій і правил щодо поводження з цими клітинами та їх використання в дослідницьких цілях.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes