CMT-93

305761

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

Rakuliin CMT93 on hiire kolorektaalse kartsinoomi mudel, mis on loodud C57BL/ICRF hiire keemiliselt indutseeritud pärasoolekasvaja põhjal. Tuumor tekkis pärast kokkupuudet tugeva kantserogeeni metüülasoksümetanoolatsetaadiga (MAM-atsetaat). CMT93 saadi algse tuumori neljandast in vivo siirdatud põlvkonnast ja kultiveeriti selektiivsete tripsiniseerimistehnikate abil, et isoleerida epiteelirakkude populatsioonid, eemaldades samal ajal mesenküümilised saasteained. Korduva subkultiveerimise ja puhastamise tulemusena näitas saadud rakuliin stabiilset epiteelimorfoloogiat ja kasvumustrit.
In vitro kasvavad CMT93 rakud ühtsetes epiteelirakkude kimpudes ja näitavad diferentseerunud sooleepiteelirakkude iseloomulikke tunnuseid. Elektronmikroskoopia näitas glükoproteiini ahelatega mikrovillide, desmosomaalsete liideste ja aeg-ajalt esinevate acinus-laadsete struktuuride olemasolu, mis viitab normaalse rektaalepiteeli arhitektuuri osalisele säilimisele. Need rakud on väga adhesiivsed ja kasvavad konfluentsiks umbes 7 päeva pärast 1:2 jagamist. Kuigi need on valdavalt epiteelrakud, sisaldasid varased passaažid segapopulatsioone, mis lahendati järjestikuste selektiivsete subkultiveerimiste abil. Liini on säilitatud arvukate passaažide jooksul ja edukalt krüokonserveeritud pikaajaliseks kasutamiseks.
CMT93-t kasutatakse laialdaselt seedetrakti vähi uurimisel, eriti uuringutes, mis käsitlevad kolorektaalse vähi teket, epiteeli-mesenküümilisi interaktsioone, immuunvastuseid ja mikroobide-peremehe interaktsioone. Seda kasutatakse ka lühikeste tandemkorduste (STR) profiilide uuringutes, et toetada hiire rakuliinide liigisisest autentimist, kinnitades selle unikaalset identiteeti ja väärtust valideeritud mudelina prekliinilistes uuringutes.

Kude	Rektum
Haigus	Hiire pärasoolevähk

Sünonüümid

- CMT-93
- CMT 93
- C57 Mouse Tumor 93

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Hiir
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Rakutüüp	Epiteel

TUNNUSED

Viide

CMT-93 (Cytioni kataloginumber 305761)

NCBI maksukood	10090
Cellosaurus	CVCL_1986

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

DMEM, w: 4,5 g/L glükoosi, w: 4 mM L-glutamiini, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM naatriumpüruvaati (Cytioni artikli number 820300a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase
Külvitihedus	1 kuni 3 x 10^4 rakku/cm^2
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Tõug / alamliik	C57BL/icrf
Doonori vanus	1 aasta ja 7 kuud

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes