CMT-93

305761

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa CMT93 stanowi mysi model raka jelita grubego, uzyskany z nowotworu odbytnicy wywołanego chemicznie u myszy rasy C57BL/ICRF. Nowotwór powstał w wyniku ekspozycji na octan metyloazoksymetanolu (octan MAM), silny czynnik rakotwórczy. Linia CMT93 pochodzi z czwartej generacji przeszczepów in vivo pierwotnego nowotworu i została wyhodowana przy użyciu technik selektywnej trypsynizacji w celu izolacji populacji nabłonkowych przy jednoczesnym usuwaniu zanieczyszczeń mezenchymalnych. Dzięki wielokrotnym subkulturowi i oczyszczaniu uzyskana linia komórkowa wykazywała stabilną morfologię nabłonkową i wzorzec wzrostu.
In vitro komórki CMT93 rosną w spójnych skupiskach nabłonkowych i wykazują charakterystyczne cechy zróżnicowanych komórek nabłonka jelitowego. Mikroskopia elektronowa ujawniła obecność mikrokosmków z pasmami glikoprotein, połączeń desmosomalnych oraz sporadycznych struktur przypominających zraziki, co sugeruje częściowe zachowanie normalnej architektury nabłonka odbytnicy. Komórki te charakteryzują się wysoką adhezyjnością i osiągają konfluencję w ciągu około 7 dni po podziale w stosunku 1:2. Chociaż przeważają komórki nabłonkowe, wczesne pasażowania obejmowały populacje mieszane, które zostały rozdzielone poprzez sekwencyjne selektywne subkulturowanie. Linia była utrzymywana przez wiele pasażowań i pomyślnie zamrożona do długoterminowego wykorzystania.
CMT93 jest szeroko stosowana w badaniach nad nowotworami przewodu pokarmowego, szczególnie w badaniach dotyczących karcynogenezy jelita grubego, interakcji nabłonkowo-mezenchymalnych, odpowiedzi immunologicznej oraz interakcji między mikroorganizmami a gospodarzem. Wykorzystuje się ją również w badaniach profilowania krótkich powtórzeń tandemowych (STR) w celu potwierdzenia autentyczności linii komórkowych myszy w obrębie gatunku, co potwierdza jej wyjątkową tożsamość i wartość jako sprawdzonego modelu w badaniach przedklinicznych.

Chusteczka	Odbytnica
Choroba	Rak odbytnicy myszy

Synonimy

- CMT-93
- CMT 93
- C57 Mouse Tumor 93

KLASYFIKACJA

Organizm	Mysz
Seks	Mężczyzna
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Typ komórki	Nabłonek

IDENTYFIKATORY

Źródło

CMT-93 (numer katalogowy Cytion 305761)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_1986

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

DMEM, w: 4,5 g/l glukozy, w: 4 mM L-glutaminy, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pirogronianu sodu (numer artykułu Cytion 820300a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Accutase
Gęstość wysiewu	1 do 3 x 10^4 komórek/cm^2
Odnawianie płynów	2 do 3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C. Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Rasa / podgatunek	C57BL/icrf
Wiek dawcy	1 rok i 7 miesięcy

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Zastrzeżenie

Nasze komórki są dostarczane wyłącznie do celów badań laboratoryjnych in vitro i nie są przeznaczone do użytku klinicznego lub diagnostycznego, nie mogą być podawane ludziom ani wykorzystywane do celów weterynaryjnych. Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących wytycznych i przepisów dotyczących obchodzenia się z tymi komórkami i korzystania z nich w środowisku badawczym.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes