EFO-27

305769

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия EFO-27 е модел на човешки овариален карцином, получен от умерено диференциран серозен папиларен аденокарцином. Тя е създадена от солидна метастаза в оментата при пациентка с рак на яйчниците в напреднал стадий. EFO-27 е част от серия клетъчни линии, получени от овариални тумори, разработени с цел проучване на хормоналната регулация на пролиферацията на раковите клетки на яйчниците. В ранните пасажи EFO-27 е описана като анеуплоидна, с модален брой хромозоми над 100, което показва висока степен на хромозомна нестабилност – често срещана характеристика на високостепенните серозни карциноми на яйчниците.
Клетките EFO-27 проявяват епителиоидна морфология in vitro и е доказано, че образуват куполовидни многоклетъчни структури в монослойна култура, фенотип, понякога свързан с активен йонен транспорт и образуване на плътни съединения. В безсерумни среди пролиферацията на EFO-27 беше стимулирана от гонадотропни хормони, по-специално човешки хорионгонадотропин (hCG) и фоликулостимулиращ хормон (FSH), което предполага, че клетките запазват функционални сигнални пътища на хормоналните рецептори. Тази реактивност подчертава потенциалната роля на гонадотропната сигнализация в насърчаването на туморния растеж и прогресията при карцином на яйчниците и подкрепя EFO-27 като подходящ модел за изучаване на хормонално-управляваните механизми в биологията на рака на яйчниците.
EFO-27 е включен и в големи мулти-омични бази данни, като Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) и COSMIC, където неговият геномни профил допринася за картиране на лекарствената чувствителност и класифициране на туморните подтипове. Тези бази данни предоставят допълнителни слоеве информация, включително генна експресия, промени в броя на копията и мутационен пейзаж, което позиционира EFO-27 като добре характеризиран ресурс за предклинични изследвания при рака на яйчниците.

Тъкан	Метастатичен
Заболяване	Муцинозен аденокарцином на яйчниците
Място на метастазите	Оментум

Синоними

- EFO 27
- EFO27

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клетка	Епителиоидни клетки, които растат адхезивно като монослой
Време за удвояване	29 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

EFO-27 (каталожен номер на Cytion 305769)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1192

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Мутационен профил

Мутация: PTEN, проста, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), хетерозиготна (Cosmic-CLP=906852), TP53, проста, p.Arg273Cys (c.817C>T), хетерозиготна (Cosmic-CLP=906852)

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Добавете към средата 20% FBS, допълнително 2,0 mM L-глутамин, 1% NEAA и 1 mM натриев пируват

Реагент за дисоциация	Accutase
Плътност на засяването	от 1 до 3 × 10^4 клетки/cm^2
Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	36 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Отказ от отговорност

Нашите клетки се предоставят изключително за целите на лабораторни изследвания in vitro и не са предназначени за клинична или диагностична употреба, нито да се прилагат на хора или да се използват за ветеринарни цели. Потребителите трябва да се придържат към всички приложими насоки и разпоредби за боравене и използване на тези клетки в изследователска среда.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes