EFO-27

305769

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie EFO-27 je model lidského karcinomu vaječníků odvozený od středně diferencovaného serózního papilárního adenokarcinomu. Byla izolována z solidní metastázy na omentu u pacientky s pokročilým stadiem rakoviny vaječníků. EFO-27 je součástí řady buněčných linií odvozených z nádorů vaječníků, které byly vyvinuty za účelem zkoumání hormonální regulace proliferace buněk rakoviny vaječníků. V raných pasážích byla EFO-27 popsána jako aneuploidní, s modálním počtem chromozomů přesahujícím 100, což naznačuje vysoký stupeň chromozomální nestability, což je běžný rys vysoce diferencovaných serózních karcinomů vaječníků.
Buňky EFO-27 vykazují in vitro epiteliální morfologii a bylo prokázáno, že v monovrstvé kultuře tvoří kopulovité multicelulární struktury, což je fenotyp někdy spojovaný s aktivním transportem iontů a tvorbou těsných spojů. V bezsérových médiích byla proliferace EFO-27 stimulována gonadotropními hormony, konkrétně lidským choriogonadotropinem (hCG) a folikuly stimulujícím hormonem (FSH), což naznačuje, že buňky si zachovávají funkční signální dráhy hormonálních receptorů. Tato reaktivita zdůrazňuje potenciální roli gonadotropinové signalizace při podpoře růstu a progrese nádoru u karcinomu vaječníků a podporuje EFO-27 jako relevantní model pro studium hormonálně řízených mechanismů v biologii rakoviny vaječníků.
EFO-27 byl také zařazen do významných multiomických datových sad, jako jsou Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) a COSMIC, kde jeho genomický profil přispívá k mapování citlivosti na léky a klasifikaci podtypů nádorů. Tyto datové sady poskytují další vrstvy informací, včetně genové exprese, změn počtu kopií a mutačního profilu, což z EFO-27 činí dobře charakterizovaný zdroj pro preklinický výzkum rakoviny vaječníků.

Tkáň	Metastatické
Nemoc	Mucinózní adenokarcinom vaječníků
Místo metastázy	Omentum

Synonyma

- EFO 27
- EFO27

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Typ buňky	Epiteloidní buňky rostoucí v adhezivní monovrstvě
Doba zdvojnásobení	29 hodin

IDENTIFIKÁTORY

Citace

EFO-27 (katalogové číslo Cytion 305769)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1192

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Mutační profil

Mutace: PTEN, jednoduchá, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), heterozygotní (Cosmic-CLP=906852), TP53, jednoduchá, p.Arg273Cys (c.817C>T), heterozygotní (Cosmic-CLP=906852)

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium 20 % FBS, dalšími 2,0 mM L-glutaminu, 1 % NEAA a 1 mM pyruvátu sodného

Disociační činidlo	Accutase
Hustota výsevu	1 až 3 × 10^4 buněk/cm^2
Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	36 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše buňky jsou poskytovány výhradně pro účely laboratorního výzkumu in vitro a nejsou určeny pro klinické nebo diagnostické použití, ani nejsou určeny k podávání lidem nebo použití pro veterinární účely. Uživatelé musí dodržovat všechny platné pokyny a předpisy pro zacházení s těmito buňkami a jejich použití ve výzkumném prostředí.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes