EFO-27

305769

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az EFO-27 sejtvonal egy közepesen differenciált szérum papilláris adenokarcinómából származó humán petefészekrák-modell. Egy előrehaladott stádiumú petefészekrákos beteg szilárd omentális áttétéből állították elő. Az EFO-27 egy olyan, petefészekdaganatokból származó sejtvonalakból álló sorozat része, amelyet a petefészekrákos sejtek szaporodásának hormonális szabályozásának feltárására fejlesztettek ki. A korai passzázsokban az EFO-27-ről aneuploidnak bizonyult, a modális kromoszómaszám meghaladta a 100-at, ami magas fokú kromoszómális instabilitásra utal, ami a magas fokozatú szérumos petefészekrákok gyakori jellemzője.
Az EFO-27 sejtek in vitro epithelioid morfológiát mutatnak, és kimutatták, hogy egyrétegű tenyészetben kupola-szerű, többsejtű struktúrákat képeznek, ami egy olyan fenotípus, amelyet néha aktív iontranszporttal és szoros kapcsolódások kialakulásával társítanak. Szérummentes táptalajon az EFO-27 proliferációját gonadotrop hormonok, konkrétan a humán koriongonadotropin (hCG) és a follikulusz-stimuláló hormon (FSH) stimulálta, ami arra utal, hogy a sejtek megőrzik a funkcionális hormonreceptor-jelátviteli útvonalakat. Ez a reagálóképesség rávilágít a gonadotropin jelátvitel potenciális szerepére a petefészekrák tumor növekedésének és progressziójának elősegítésében, és alátámasztja, hogy az EFO-27 releváns modell a petefészekrák biológiájában a hormonok által vezérelt mechanizmusok tanulmányozásához.
Az EFO-27 bekerült olyan jelentős multi-omikai adatbázisokba is, mint a Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) és a COSMIC, ahol genomikus profilja hozzájárul a gyógyszerérzékenység feltérképezéséhez és a tumor altípusok osztályozásához. Ezek az adatbázisok további információkat nyújtanak, beleértve a génexpressziót, a kópiaszám-változásokat és a mutációs képet, így az EFO-27 jól jellemzett forrásként szolgál a petefészekrák preklinikai kutatásához.

Szövet	Metasztatikus
Betegség	Petefészek-mucinózus adenokarcinóma
Áttétes hely	Omentum

Szinonimák

- EFO 27
- EFO27

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Sejttípus	Epithelioid sejtek, amelyek egyrétegűként tapadva szaporodnak
Kettőzési idő	29 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

EFO-27 (Cytion katalógusszám: 305769)

NCBI adóazonosító szám	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1192

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Mutációs profil

Mutáció: PTEN, egyszerű, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), heterozigóta (Cosmic-CLP=906852), TP53, egyszerű, p.Arg273Cys (c.817C>T), heterozigóta (Cosmic-CLP=906852)

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 20% FBS-sel, további 2,0 mM L-glutaminnal, 1% NEAA-val és 1 mM nátrium-piruváttal

Diszociációs reagens	Accutase
Ültetési sűrűség	1–3 × 10^4 sejt/cm^2
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	36 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Sejtjeinket kizárólag in vitro laboratóriumi kutatási célokra bocsátjuk rendelkezésre, és nem szánjuk klinikai vagy diagnosztikai felhasználásra, nem adhatóak be embereknek, és nem használhatók fel állatorvosi célokra. A felhasználóknak be kell tartaniuk a sejtek kutatási környezetben történő kezelésére és felhasználására vonatkozó valamennyi vonatkozó irányelvet és előírást.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes