GP2D

305778

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

GP2d is een menselijke celijn van colorectaal adenocarcinoom, afkomstig van een slecht gedifferentieerde dikke-darmtumor. Deze celijn werd samen met een zusterlijn, GPSd, opgericht uit hetzelfde adenocarcinoom-monster. Hoewel beide lijnen vergelijkbare genetische veranderingen vertonen die overeenkomen met veelvoorkomende patronen bij colorectale kanker, waaronder een omgekeerde duplicatie op chromosoom 10q11-q21, verschillen ze aanzienlijk in hun fenotypische kenmerken en cellulair gedrag. Opvallend is dat er bij Southern-blotanalyse geen translocaties werden gedetecteerd waarbij het ret-proto-oncogen – dat in dit chromosomale gebied is gekartoteerd – betrokken was, wat suggereert dat de duplicatie dit gen niet direct heeft verstoord.
GP2d-cellen vertonen een samenhangend, zich uitbreidend groeipatroon vanaf de randen van microkolonies, waardoor een confluente epitheliale monolaag wordt gevormd. Deze morfologie gaat gepaard met duidelijke expressiepatronen van adhesiemoleculen zoals α2-integrine, desmoplakine en E-cadherine, die allemaal een rol spelen bij het behoud van de epitheliale integriteit. Functioneel reageren GP2d-cellen krachtig op epidermale groeifactor (EGF), transformerende groeifactor-alfa (TGFα) en insuline, zoals blijkt uit de verhoogde celproliferatie als reactie op deze liganden. Interessant is dat zowel GP2d- als GPSd-cellen een vergelijkbaar aantal EGF-receptoren tot expressie brengen, maar verschillen in hun expressie van EGF-receptorliganden. GP2d-cellen hebben overvloedig amphireguline-mRNA, terwijl GPSd-cellen voornamelijk TGFα-mRNA tot expressie brengen met weinig tot geen amphireguline, wat correleert met de waargenomen verschillende biologische reacties.
Deze kenmerken maken GP2d tot een waardevol model voor het bestuderen van de regulatie van groeifactorsignalering en celadhesie bij colorectale kanker. De responsiviteit op stimuli van de EGF-route en de kenmerkende epitheliale morfologie onderstrepen het nut ervan bij het onderzoeken van tumorceldifferentiatie en -proliferatie. Bovendien maakt de gedeelde oorsprong met GPSd vergelijkende studies mogelijk van klonale variatie binnen tumoren, met name in de context van ligand-receptordynamica en reacties op de epitheliale-naar-mesenchymale overgang (EMT).

Weefsel	Kolon
Ziekte	Adenocarcinoom

Synoniemen

- Gp2d
- Gp2D
- GP2D

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Vrouw
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

GP2D (Cytion-catalogusnummer 305778)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_2450

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Mutatieprofiel

Mutatie: KRAS, enkelvoudig, p.Gly12Asp (c.35G>A), heterozygoot, TP53

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamine, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat (Cytion artikelnummer 820300a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	71 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Disclaimer

Onze cellen worden uitsluitend geleverd voor in vitro laboratoriumonderzoek en zijn niet bedoeld voor klinisch of diagnostisch gebruik, noch mogen ze worden toegediend aan mensen of worden gebruikt voor veterinaire doeleinden. Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften voor het hanteren en gebruiken van deze cellen in een onderzoeksomgeving.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes