HCC1187

305781

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

HCC1187 on inimese rinnanäärme kartsinoomi rakuliin, mis on loodud täiskasvanud patsiendi primaarsest duktaalsest rinnanäärme kasvajast. Sellel on kolmiknegatiivne fenotüüp, millel puudub östrogeeni retseptori (ER), progesterooni retseptori (PR) ja HER2 ekspressioon, mis on iseloomulik basaalsele rinnavähile. HCC1187 on osa rakuliinide paneelist, mis on välja töötatud rinnavähi molekulaarse mitmekesisuse esindamiseks, ning seda on ulatuslikult profileeritud mitmes suuremahulises genoomilises ja proteoomilises uuringus, sealhulgas Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) ja The Cancer Genome Atlas (TCGA)-analüüsis.
Sellel rakuliinil on keerulised genoomimuutused, mida tavaliselt täheldatakse kõrgekvaliteedilistes rinnakasvajates, näiteks koopiaarvu muutused ja somaatiliste mutatsioonide suur koormus. Proteoomilised analüüsid näitavad, et HCC1187 proteoomiline profiil on kooskõlas basaalsete rinnakasvajate profiiliga, sealhulgas basaalsete epiteelirakkudega seotud tsütokeratiinide kõrgendatud ekspressioon ja lumeaalsete markerite madal tase. Kvantitatiivne proteoomika näitab ka, et HCC1187 klasterdub teiste kolmiknegatiivse rinnavähi (TNBC) liinidega, mis põhineb valkude ekspressioonil, näidates DNA kahjustuste parandamise, rakutsükli progresseerumise ja apoptoosiga seotud radade düsregulatsiooni. Nende omaduste tõttu on HCC1187 väärtuslik mudel TNBC bioloogia uurimiseks ja suunatud ravimite testimiseks basaalilähedaste või BRCA1-puudulike rinnavähi alatüüpide puhul.
HCC1187 on kaasatud ka rinnanäärmevähi ulatuslikesse mutatsiooniuuringutesse, aidates kaasa mutatsioonisageduse mustrite ja juht- versus kaasmutatatsioonide mõistmisele. Uuringud on näidanud, et kuigi üksikud kasvajad sisaldavad arvukalt mutatsioone, aitab ainult osa neist oluliselt kaasa vähi progresseerumisele. HCC1187 puhul on tuvastatud mitu sellist juhtmutatsioone ja teekide muutusi, mis teeb sellest olulise mudeli kasvajate geneetiliste aluste uurimiseks ja isikupärastatud ravimeetodite väljatöötamiseks.

Kude	Rind
Haigus	Rinnanäärme duktaalne kartsinoom

Sünonüümid

- HCC-1187
- Hamon Cancer Center 1187

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Naine
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Epiteel
Rakutüüp	Epiteelirakk
Tuumorigeenne	Jah, kasvaja klassifitseeriti TNM IIA staadiumi, 3. astme, invasiivse ductus-kartsinoomiga.
Kahekordistumisaeg	100 tundi

TUNNUSED

Viide

HCC1187 (Cytioni kataloginumber 305781)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_1247

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Valgu ekspressioon

Progesterooni retseptor, negatiivne

Antigeeni ekspressioon

Epiteeli glükoproteiin 2 (EGP2); tsütokeratiin 19

Onkogeenid

Her2/neu-; p53+

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: TP53, Simple, p.Gly108del (c.322_324delGGT), homosügootne (Cosmic-CLP=749711)

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	41 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""'x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes