HCC1187

305781

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A HCC1187 é uma linha celular de carcinoma da mama humano estabelecida a partir de um tumor primário da mama ductal de um doente adulto. Apresenta um fenótipo triplo-negativo, sem expressão do recetor de estrogénio (ER), do recetor de progesterona (PR) e do HER2, que é caraterístico dos cancros da mama do tipo basal. A HCC1187 faz parte de um painel de linhas celulares desenvolvido para representar a diversidade molecular dos cancros da mama, tendo sido extensivamente caracterizada em vários estudos genómicos e proteómicos de grande escala, incluindo a Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) e as análises alinhadas com o The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Esta linha celular apresenta alterações genómicas complexas normalmente observadas em tumores da mama de alto grau, tais como variações do número de cópias e um elevado número de mutações somáticas. As análises proteómicas revelam que o HCC1187 tem um perfil proteómico alinhado com os tumores da mama do tipo basal, incluindo uma expressão elevada de citoqueratinas associadas às células epiteliais basais e níveis baixos de marcadores luminais. A proteómica quantitativa também mostra que o HCC1187 se agrupa com outras linhas de cancro da mama triplo-negativo (TNBC) com base na expressão de proteínas ao nível das vias, demonstrando uma desregulação nas vias relacionadas com a reparação de danos no ADN, a progressão do ciclo celular e a apoptose. Estas propriedades fazem do HCC1187 um modelo valioso para o estudo da biologia do TNBC e para o ensaio de terapêuticas específicas para subtipos de cancro da mama do tipo basal ou com deficiência de BRCA1.
O HCC1187 foi também incluído em estudos mutacionais abrangentes sobre o cancro da mama, contribuindo para a compreensão dos padrões de frequência das mutações e do panorama das mutações controladoras versus mutações secundárias. Os estudos demonstraram que, apesar de os tumores individuais albergarem numerosas mutações, apenas um subconjunto contribui significativamente para a progressão do cancro. No HCC1187, foram identificadas várias mutações determinantes e alterações de vias, o que o torna um modelo fundamental para explorar a base genética da tumorigénese e para desenvolver abordagens terapêuticas personalizadas.

Tecido	Peito
Doença	Carcinoma ductal da mama

Sinónimos

- HCC-1187
- Hamon Cancer Center 1187

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Feminino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Epitelial
Tipo de célula	Célula epitelial
Tumorigénico	Sim, o tumor foi classificado como TNM estádio IIA, grau 3, carcinoma ductal invasivo.
Tempo de duplicação	100 horas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICADORES

Referência

HCC1187 (número de catálogo Cytion 305781)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1247

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão proteica

Recetor de progesterona, negativo

Expressão do antígeno

Glicoproteína epitelial 2 (EGP2); citoqueratina 19

Oncogenes

Her2/neu-; p53+

Perfil mutacional

Mutação: TP53, Simples, p.Gly108del (c.322_324delGGT), Homozigótico (Cosmic-CLP=749711)

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase
Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	41 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Aviso legal

As nossas células são fornecidas exclusivamente para fins de investigação laboratorial in vitro e não se destinam a utilização clínica ou de diagnóstico, nem devem ser administradas a seres humanos ou utilizadas para fins veterinários. Os utilizadores devem aderir a todas as diretrizes e regulamentos aplicáveis para o manuseamento e utilização destas células num ambiente de investigação.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes