HCC1569

305784

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

HCC1569 er en human brystkræftcellelinje, der stammer fra et primært duktalt karcinom. Den udviser en basallignende fænotype og er karakteriseret som østrogenreceptor (ER)-negativ og HER2-positiv, en molekylær subtype med forskellige kliniske og terapeutiske implikationer. Ligesom andre basallignende brystkræftformer mangler HCC1569 udtryk for ER og progesteronreceptor (PR), men den viser amplifikation og overudtryk af ERBB2 (HER2)-onkogenet, et vigtigt mål for HER2-rettede terapier. Cellelinjen udviser en høj grad af aneuploidi og har flere genomiske ændringer, der er relevante for brystkræftbiologien.
HCC1569 indgår i store genomiske profileringsindsatser som Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) og relaterede undersøgelser, der integrerer mutations-, kopinummer-, methylerings- og ekspressionsdata. Disse datasæt har vist, at HCC1569 bærer strukturelle varianter og kopitalsforstærkninger, der er i overensstemmelse med aggressive brysttumorer, herunder dem, der involverer HER2. Funktionelle genomiske screeninger har fremhævet denne cellelinjes afhængighed af HER2-signalveje, hvilket understøtter dens anvendelse til evaluering af HER2-målrettede terapier og resistensmekanismer.
Derudover er HCC1569 blevet karakteriseret for sin HLA-genotype og -ekspressionsprofil, hvilket har betydning for udviklingen af immunterapi. Den er inkluderet i kataloger over HLA-typning og neoantigenforudsigelse, hvilket giver muligheder for at udforske T-celleepitop-præsentation og immungenkendelse i HER2-positive brystkræftsammenhænge. Denne immunogenomiske annotation gør HCC1569 til en værdifuld ressource, ikke kun til at studere onkogen signalering, men også til at evaluere tumor-immuninteraktioner og designe personlige immunterapier.

Væv	Bryst
Sygdom	Duktalt karcinom i brystet

Synonymer

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitelial
Celletype	Epitelcelle

Karyotype

Polyploid

Fordoblingstid	45 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

HCC1569 (Cytion katalognummer 305784)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1255

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Proteinekspression

Østrogenreceptor, negativ; progesteronreceptor, negativ

Antigenudtryk

Epithelial glycoprotein 2 (EGP2); cytokeratin 19

Onkogener

Her2/neu+; p53-

Mutationsprofil

Mutation: BRCA2, Simple, p.Asn1100Thr (c.3299A>C), Heterozygot, BRCA2, Simple, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), Heterozygot, FHIT, Simple, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, Heterozygot, Note=Germline. Mutation, PTEN, Simple, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), Heterozygot, TP53, Simple, p.Glu294Ter (c.880G>T), Heterozygot

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	70 år
Etnisk tilhørsforhold	Afroamerikaner

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Ansvarsfraskrivelse

Vores celler leveres udelukkende til in vitro-laboratorieforskningsformål og er ikke beregnet til klinisk eller diagnostisk brug, og de må heller ikke administreres til mennesker eller bruges til veterinære formål. Brugere skal overholde alle gældende retningslinjer og regler for håndtering og brug af disse celler i en forskningsmæssig sammenhæng.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes