HCC1569

305784

□要

□明

HCC1569□原発性乳管癌に由来するヒト乳癌細胞株である。 HCC1569□基底様表現型を示し、エストロゲン受容体（ER）陰性、HER2陽性という特徴的な分子サブタイプである。他の基底様乳癌と同様に、 HCC1569□ERとプロゲステロン受容体（PR）の発現を欠くが、HER2指向性治療の重要な標的である癌遺伝子 ERBB2（HER2）の増幅と過剰発現を示す。この細胞株 □高度な異数性を示し、乳癌生物学に関連する複数のゲノム変化を保有している。

HCC1569□ ′ Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE)や、変異、コピー数、メチル化、発現データを統合した関連研究などの大規模なゲノム・プロファイリングの取り組みに含まれている。これらのデータセットから、 HCC1569□HER2を含む侵攻性乳癌と一致する構造変異やコピー数増幅を有することが示された。機能的ゲノムスクリーニングにより、この細胞株のHER2シグナル伝達経路への依存性が強調され、 HER2を標的とした治療法や耐性メカニズムの評価への利用が支持された。

さらに、HCC1569□そのHLA遺伝子型と発現プロフィールが特徴づけられており、これ□免疫療法の開発に示唆を与える。 HCC1569□ ′ HLAタイピングとネオアンチゲン予測のカタログに含まれており、 HER2陽性乳癌におけるT細胞エピトープ提示と免疫認識を探索する機会を提供している。このようなイムノゲノムのアノテーションにより、HCC1569□がん原性シグナル伝達の研究だけでなく、腫瘍と免疫の相互作用の評価や個別化免疫療法の設計のための貴重なリソースとなる。

ティッシュ	乳房
病気	乳管がん

同義語

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

分類

生物	人間
セックス	女性
成長特性	アドヘレント
バイオセーフティレベル	1

特徴

形態学	上皮
細胞の種類	上皮細胞

核型

倍数体

倍増時間	45時間

識別子

引用

HCC1569（Cytion カタログ番号 305784）

NCBI 納税者番号	9606
セロサウルス	CVCL_1255

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

発現と感受性

タンパク質の発現

エストロゲン受容体、陰性；プロゲステロン受容体、陰性

抗原発現

上皮糖タンパク質2 (EGP2); サイトケラチン19

発がん遺伝子

Her2/neu+; p53

変異プロファイル

変異BRCA2, 単純型, p.Asn1100Thr (c.3299A>C), ヘテロ接合体, BRCA2, 単純型, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), ヘテロ接合体, FHIT, 単純型, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, ヘテロ接合体, 注釈=Germline.変異, PTEN, 単純型, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), ヘテロ接合体, TP53, 単純型, p.Glu294Ter (c.880G>T), ヘテロ接合体

取り扱いと飼育

培地

RPMI1640・w: 2.0mM安定グルタミン、w: 2.0g/L NaHCO3（Cytion article number 820700a）

培養雰囲気	37℃・5%CO2、加湿雰囲気。

サプリメント

培地に10% FBSを加える

解離試薬	アキュターゼ
流体の更新	週2～3回

解凍と培養

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

品質管理と凍結保存

無菌性

マイコプラズマ汚染□・PCRベースのアッセイと発光ベースのマイコプラズマ検出法の両方を用いて除外される。
細菌、真菌、酵母のコンタミネーションがないことを確認するため、細胞培養物 □毎日目視検査が行われる。

凍結培地	凍結保存培地として□、融解後の生存率を十分に高めるために完全増殖培地（ FBSを含む）＋10%DMSO、また□回復を促進し凍結によるストレスを軽減するために最適化された浸透保護剤と代謝安定剤を含む CM-1（Cytionカタログ番号800100）を使用している。

保管条件

長期保存の場合、バイアルを-150～-196℃の気相液体窒素に入れる。80℃での保存□、液体窒素に移す前の短い暫定措置としてのみ許容される。

配送条件

凍結保存された細胞株□、輸送中約-78℃を維持するのに十分な保冷剤とともに、有効な断熱包装でドライアイスとともに輸送される。受領後、直ちに容器を検査し、遅滞なくバイアルを適切な保管場所に移してください。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

寄付者

ドナーの年齢	70年
民族	アフリカ系アメリカ人

法務・安全

安全上の注意事項

将来の融解のためにクライオバイアルを液体窒素に保存する場合、厳格な安全対策を遵守することが必須である。適切な保護手袋と保護衣　□不可欠であり、液体窒素タンクへの凍結サンプルの移動中また□液体窒素タンクからの凍結サンプルの移動中に □、フェイスマスクまた□安全ゴーグルの使用が義務付けられている。これ □、凍結試料を取り出す際に、凍結試料が爆発し、鋭利な破片が飛び散って怪我をするリスクを軽減するためである。

免責事項

当社の細胞□、試験管内での研究目的に限定して提供されるものであり、臨床的また □診断的使用を意図したもので □なく、ヒトへの投与や獣医学的目的に使用されるものでもありません。使用者□、研究環境におけるこれらの細胞の取り扱いと使用について、適用されるすべてのガイドラインと規制を遵守しなければなりません。

保証

サイシオン□、製品の品質と生存率を保証します。
当社で□、培養を開始した時点で、当社施設からの出荷後 60日間、細胞が生存可能であることを保証しています。
すべての材料が、分析証明書および／また□製品シートに記載された仕様に適合していることを保証します。
詳細について□ ′ <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Warranty Statement をご参照ください。

物質移転契約書の締結が必要	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB