HCC1569

305784

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

HCC1569 is een menselijke borstkankercellijn afkomstig van een primair ductaal carcinoom. Het vertoont een basaal fenotype en wordt gekarakteriseerd als oestrogeenreceptor (ER)-negatief en HER2-positief, een moleculair subtype met verschillende klinische en therapeutische implicaties. Net als andere basaalachtige borstkankers heeft HCC1569 geen expressie van ER en progesteronreceptor (PR), maar wel amplificatie en overexpressie van het ERBB2 (HER2) oncogen, een belangrijk doelwit voor HER2-gerichte therapieën. De cellijn vertoont een hoge mate van aneuploïdie en bevat meerdere genomische veranderingen die relevant zijn voor de biologie van borstkanker. HCC1569 is opgenomen in grootschalige genomische profilering zoals de Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) en verwante studies die mutatie-, kopiegetal-, methylerings- en expressiegegevens integreren. Deze datasets hebben aangetoond dat HCC1569 structurele varianten en kopieën bevat die consistent zijn met agressieve borsttumoren, inclusief die waarbij HER2 betrokken is. Functionele genomische schermen hebben de afhankelijkheid van deze cellijn van HER2-signaalroutes aangetoond, waardoor het gebruik ervan bij de evaluatie van HER2-gerichte therapieën en resistentiemechanismen wordt ondersteund.
Daarnaast is HCC1569 gekarakteriseerd voor zijn HLA-genotype en expressieprofiel, wat implicaties heeft voor de ontwikkeling van immunotherapie. Het is opgenomen in catalogi van HLA-typering en neoantigeenvoorspelling, wat mogelijkheden biedt voor het onderzoeken van T-cel epitopenpresentatie en immuunherkenning in HER2-positieve borstkankercontexten. Deze immunogenomische annotatie maakt HCC1569 niet alleen een waardevolle bron voor het bestuderen van oncogene signalering, maar ook voor het evalueren van tumor-immuuninteracties en het ontwerpen van gepersonaliseerde immuuntherapieën.

Weefsel	Borst
Ziekte	Borstductaal carcinoom

Synoniemen

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Vrouw
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheel
Celtype	Epitheelcel

Karyotype

Polyploïde

Verdubbelingstijd	45 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

HCC1569 (Cytion catalogusnummer 305784)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1255

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Eiwit-expressie

Oestrogeenreceptor, negatief; progesteronreceptor, negatief

Antigeenexpressie

Epitheliaal glycoproteïne 2 (EGP2); cytokeratine 19

Oncogenen

Her2/neu+; p53-

Mutatieprofiel

Mutatie: BRCA2, Simple, p.Asn1100Thr (c.3299A>C), Heterozygoot, BRCA2, Simple, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), Heterozygoot, FHIT, Simple, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, Heterozygoot, Note=Germline. Mutatie, PTEN, eenvoudig, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), Heterozygoot, TP53, eenvoudig, p.Glu294Ter (c.880G>T), Heterozygoot

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	70 jaar
Etnische afkomst	Afro-Amerikaan

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Disclaimer

Onze cellen worden uitsluitend geleverd voor in vitro laboratoriumonderzoek en zijn niet bedoeld voor klinisch of diagnostisch gebruik, noch mogen ze worden toegediend aan mensen of worden gebruikt voor veterinaire doeleinden. Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften voor het hanteren en gebruiken van deze cellen in een onderzoeksomgeving.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes