HCC1569

305784

GENERAL INFORMATION

Description

A HCC1569 é uma linhagem celular de câncer de mama humano derivada de um carcinoma ductal primário. Ela apresenta um fenótipo do tipo basal e é caracterizada como negativa para o receptor de estrogênio (ER) e positiva para HER2, um subtipo molecular com implicações clínicas e terapêuticas distintas. Assim como outros cânceres de mama do tipo basal, a HCC1569 não apresenta expressão do ER nem do receptor de progesterona (PR), mas apresenta amplificação e superexpressão do oncogene ERBB2 (HER2), um alvo-chave para terapias direcionadas ao HER2. A linhagem celular apresenta um alto grau de aneuploidia e abriga múltiplas alterações genômicas relevantes para a biologia do câncer de mama.
A HCC1569 está incluída em iniciativas de mapeamento genômico em larga escala, como a Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) e estudos relacionados que integram dados de mutações, número de cópias, metilação e expressão. Esses conjuntos de dados demonstraram que a HCC1569 apresenta variantes estruturais e amplificações no número de cópias consistentes com tumores de mama agressivos, incluindo aqueles que envolvem o HER2. Triagens genômicas funcionais destacaram a dependência dessa linha celular das vias de sinalização do HER2, corroborando seu uso na avaliação de terapias direcionadas ao HER2 e de mecanismos de resistência.
Além disso, a HCC1569 foi caracterizada quanto ao seu genótipo HLA e perfil de expressão, o que tem implicações para o desenvolvimento de imunoterapias. Ela está incluída em catálogos de tipagem de HLA e previsão de neoantígenos, oferecendo oportunidades para explorar a apresentação de epítopos de células T e o reconhecimento imunológico em contextos de câncer de mama HER2-positivo. Essa anotação imunogenômica torna a HCC1569 um recurso valioso não apenas para o estudo da sinalização oncogênica, mas também para a avaliação das interações tumor-imunológicas e o desenvolvimento de imunoterapias personalizadas.

Tissue	Mama
Disease	Carcinoma ductal da mama

Synonyms

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Epithelial
Cell type	Célula epitelial

Karyotype

Poliplóide

Doubling time	45 horas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

HCC1569 (número de catálogo da Cytion 305784)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1255

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

Receptor de estrogênio: negativo; receptor de progesterona: negativo

Antigen expression

Glicoproteína epitelial 2 (EGP2); citoqueratina 19

Oncogenes

Her2/neu+; p53-

Mutational profile

Mutação: BRCA2, Simples, p.Asn1100Thr (c.3299A>C), Heterozigoto, BRCA2, Simples, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), Heterozigoto, FHIT, Simples, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, heterozigótica, Observação=germinal. Mutação, PTEN, Simples, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), Heterozigoto, TP53, Simples, p.Glu294Ter (c.880G>T), heterozigoto

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Accutase
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	70 anos
Ethnicity	afro-americano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Disclaimer

Nossas células são fornecidas exclusivamente para fins de pesquisa laboratorial in vitro e não se destinam ao uso clínico ou diagnóstico, nem devem ser administradas a seres humanos ou utilizadas para fins veterinários. Os usuários devem cumprir todas as diretrizes e regulamentações aplicáveis ao manuseio e uso dessas células em um ambiente de pesquisa.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes