HCC1569

305784

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

HCC1569 je ľudská bunková línia karcinómu prsníka odvodená z primárneho duktálneho karcinómu. Vykazuje bazálny fenotyp a je charakterizovaná ako estrogén receptor (ER) negatívna a HER2 pozitívna, čo je molekulárny podtyp s odlišnými klinickými a terapeutickými dôsledkami. Podobne ako iné bazálne karcinómy prsníka, aj HCC1569 nemá expresiu ER a progesterónového receptora (PR), ale vykazuje amplifikáciu a nadmernú expresiu onkogénu ERBB2 (HER2), ktorý je kľúčovým cieľom terapií zameraných na HER2. Bunková línia vykazuje vysoký stupeň aneuploidie a obsahuje viaceré genomické zmeny dôležité pre biológiu rakoviny prsníka.
HCC1569 je zahrnutá do rozsiahlych genomických profilov, ako je Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) a súvisiacich štúdií, ktoré integrujú údaje o mutáciách, počte kópií, metylácii a expresii. Tieto súbory údajov ukázali, že HCC1569 obsahuje štrukturálne varianty a amplifikácie počtu kópií, ktoré sú v súlade s agresívnymi nádormi prsníka vrátane tých, ktoré zahŕňajú HER2. Funkčné genomické skríningy poukázali na závislosť tejto bunkovej línie od signálnych dráh HER2, čo podporuje jej použitie pri hodnotení terapií zameraných na HER2 a mechanizmov rezistencie.
Okrem toho bol HCC1569 charakterizovaný z hľadiska genotypu a expresného profilu HLA, čo má vplyv na vývoj imunoterapie. Je zaradený do katalógov typizácie HLA a predpovede neoantigénov, čo ponúka možnosti na skúmanie prezentácie epitopov T-buniek a imunitného rozpoznávania v kontexte HER2-pozitívneho karcinómu prsníka. Vďaka tejto imunogenomickej anotácii je HCC1569 cenným zdrojom nielen na štúdium onkogénnej signalizácie, ale aj na hodnotenie interakcií medzi nádorom a imunitou a navrhovanie personalizovanej imunoterapie.

Tkanivo	Prsia
Choroba	Duktálny karcinóm prsníka

Synonymá

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelové
Typ bunky	Epitelová bunka

Karyotyp

Polyploidné

Doba zdvojnásobenia	45 hodín

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

HCC1569 (katalógové číslo Cytion 305784)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1255

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia proteínov

Estrogénový receptor, negatívny; progesterónový receptor, negatívny

Expresia antigénu

Epitelový glykoproteín 2 (EGP2); cytokeratín 19

Onkogény

Her2/neu+; p53-

Mutčný profil

Mutácia: (c.3299A>C), Heterozygot, BRCA2, Simple, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), Heterozygot, FHIT, Simple, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, Heterozygot, Pozn. Mutácia, PTEN, Simple, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), Heterozygotná, TP53, Simple, p.Glu294Ter (c.880G>T), Heterozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS

Disociačné činidlo	Accutase
Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	70 rokov
Etnická príslušnosť	Afroameričan

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Upozornenie

Naše bunky sa poskytujú výlučne na účely laboratórneho výskumu in vitro a nie sú určené na klinické alebo diagnostické použitie, ani sa nemajú podávať ľuďom alebo používať na veterinárne účely. Používatelia musia dodržiavať všetky platné smernice a predpisy pre manipuláciu a používanie týchto buniek vo výskumnom prostredí.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes