HCC1569

305784

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

HCC1569 je celična linija človeškega raka dojke, ki izhaja iz primarnega duktalnega karcinoma. Ima bazalni fenotip in je značilna kot estrogen receptor (ER) negativna in HER2 pozitivna, kar je molekularni podtip z različnimi kliničnimi in terapevtskimi posledicami. Tako kot drugi bazalno podobni raki dojk tudi HCC1569 ne izraža ER in progesteronskega receptorja (PR), kaže pa pomnožitev in prekomerno izražanje onkogena ERBB2 (HER2), ki je ključna tarča za terapije, usmerjene na HER2. Celična linija ima visoko stopnjo anevploidije in številne genomske spremembe, pomembne za biologijo raka dojk.
HCC1569 je vključena v obsežna prizadevanja za genomsko profiliranje, kot je Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), in sorodne študije, ki združujejo podatke o mutacijah, številu kopij, metilaciji in izražanju. Te zbirke podatkov so pokazale, da ima HCC1569 strukturne različice in povečanja števila kopij, ki so skladna z agresivnimi tumorji dojk, vključno s tistimi, ki vključujejo HER2. Funkcionalni genomski pregledi so poudarili odvisnost te celične linije od signalnih poti HER2, kar podpira njeno uporabo pri ocenjevanju terapij, usmerjenih na HER2, in mehanizmov odpornosti.
Poleg tega je bil za HCC1569 značilen genotip in profil izražanja HLA, kar vpliva na razvoj imunoterapije. Vključen je v kataloge za tipizacijo HLA in napovedovanje neoantigenov, kar ponuja možnosti za raziskovanje predstavitve epitopov celic T in imunskega prepoznavanja v kontekstu HER2-pozitivnega raka dojke. Zaradi te imunogenomske anotacije je HCC1569 dragocen vir ne le za preučevanje onkogene signalizacije, temveč tudi za ocenjevanje interakcij med tumorjem in imunskim sistemom ter načrtovanje personaliziranih imunoterapij.

Tkivo	Prsi
Bolezen	Duktalni karcinom dojke

Sinonimi

- HCC-1569
- Hamon Cancer Center 1569

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Epitelijski
Vrsta celice	Epitelijska celica

Kariotip

Poliploidni

Čas podvojitve	45 ur

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

HCC1569 (kataloška številka Cytion 305784)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1255

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija beljakovin

Estrogenski receptor, negativen; progesteronski receptor, negativen

Ekspresija antigena

Epitelijski glikoprotein 2 (EGP2); citokeratin 19

Onkogeni

Her2/neu+; p53-

Profil mutacij

Mutacija: (c.3299A>C), heterozigotna, BRCA2, Simple, p.Val1862fs*1 (c.5578delA), heterozigotna, FHIT, Simple, p.Val97Phe (c.289G>T) (651G>T), dbSNP=rs139666727, heterozigotna, Opomba=Germline. Mutacija, PTEN, enostavna, p.Lys267Argfs*9 (c.800delA) (p.Leu265fs, c.795delA), heterozigotna, TP53, enostavna, p.Glu294Ter (c.880G>T), heterozigotna

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Accutase
Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	70 let
Etnična pripadnost	Afroameričan

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše celice so na voljo izključno za laboratorijske raziskave in vitro in niso namenjene za klinično ali diagnostično uporabo, niti jih ni dovoljeno dajati ljudem ali uporabljati v veterinarske namene. Uporabniki morajo upoštevati vse veljavne smernice in predpise za ravnanje in uporabo teh celic v raziskovalnem okolju.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes