HCC4006

305785

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A HCC4006 é uma linha celular humana de cancro do pulmão de células não pequenas (NSCLC) derivada de um adenocarcinoma do pulmão. Caracteriza-se por uma supressão do exão 19 ativador no gene EGFR, o que a torna particularmente sensível aos inibidores da tirosina quinase (TKI) do EGFR, como o erlotinib e o gefitinib. Esta caraterística fez do HCC4006 um modelo amplamente utilizado para estudar o CPNPC com mutação do EGFR e os mecanismos de resistência a terapias direcionadas para o EGFR. Na Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), o HCC4006 foi exaustivamente caracterizado a nível genómico, transcriptómico e epigenético, confirmando a sua elevada sensibilidade à inibição do EGFR e realçando a sua utilização como modelo de referência farmacogenómico.
Estudos genómicos de alta resolução revelaram que o HCC4006 apresenta um cariótipo relativamente simples em comparação com outros modelos de NSCLC, o que pode facilitar uma interpretação mais clara das respostas aos medicamentos e das alterações genómicas. Não apresenta mutações de resistência comuns, como a T790M no gene EGFR, o que o torna adequado para modelar as respostas iniciais ao tratamento. No entanto, a resistência pode ser induzida in vitro, permitindo aos investigadores estudar os mecanismos de resistência adquirida. Por exemplo, a resistência aos TKI do EGFR no HCC4006 foi associada à transição epitelial-mesenquimal (EMT) e à ativação de vias de sinalização alternativas, como a sobreexpressão da quinase AXL.
O HCC4006 foi também avaliado em comparações transcriptómicas em grande escala de linhas celulares e tumores primários. É uma das linhas celulares de adenocarcinoma do pulmão que demonstra uma correlação moderada com os perfis de expressão de genes de tumores primários, embora o grau de correlação possa variar consoante a pureza das amostras de tumores utilizadas para comparação. Estas análises sublinham a relevância da linhagem HCC4006 na modelação de determinados aspectos moleculares do adenocarcinoma do pulmão, em particular os associados à oncogénese impulsionada pelo EGFR, ao mesmo tempo que salientam as suas limitações na recapitulação completa da heterogeneidade dos tumores primários.

Tecido	Metastático
Doença	Adenocarcinoma do pulmão
Local da metástase	Derrame pleural

Sinónimos

- HCC-4006
- Hamon Cancer Center 4006

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	Epitelial
Tipo de célula	Célula epitelial
Tempo de duplicação	46 horas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICADORES

Referência

HCC4006 (número de catálogo Cytion 305785)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1269

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Perfil mutacional

Mutação: EGFR, Simples, p.Leu747_Glu749del (c.2239_2247delTAAGAGAA), Heterozigótico (ATCC=CRL-2871, TP53, Simples, p.Tyr205His (c.613T>C), Homozigótico (DepMap=ACH-000066).

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase
Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	>50 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Aviso legal

As nossas células são fornecidas exclusivamente para fins de investigação laboratorial in vitro e não se destinam a utilização clínica ou de diagnóstico, nem devem ser administradas a seres humanos ou utilizadas para fins veterinários. Os utilizadores devem aderir a todas as diretrizes e regulamentos aplicáveis para o manuseamento e utilização destas células num ambiente de investigação.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes