HT-1197

305800

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

HT-1197 er en human urotelial karcinomcellelinje, der er etableret fra et højgradigt overgangscellekarcinom i blæren hos en voksen mandlig patient. Denne linje stammer fra en tilbagevendende tumor efter flere kirurgiske resektioner og viste aggressiv klinisk adfærd med udbredte metastaser før patientens død. Morfologisk udviser HT-1197-celler epiteliale træk, herunder tilstedeværelsen af mikrovilli, tonofibriller og desmosomer, som observeret under elektronmikroskopi, hvilket indikerer deres urotheliale epiteliale oprindelse. Disse celler er karyotypisk forskellige med identificerbare markørkromosomer og viser evnen til at vokse i blød agar, et kendetegn for forankringsuafhængig vækst, og er tumorigeniske i både nøgenmus og immunsupprimerede hamstere.
På molekylært niveau har HT-1197 flere vigtige onkogene mutationer, der ofte forbindes med blærekræft. Den har en aktiverende S249C-mutation i FGFR3 og en E545K-mutation i PIK3CA, som begge er fremherskende i patogenesen af urotelial blærecarcinom. Derudover har HT-1197 en Q61R-mutation i NRAS og mutationer i TERT-promoterregionen, hvilket tyder på øget proliferativ kapacitet og telomeraseaktivitet. TP53-status omfatter en c.1094A>G-ændring, hvilket yderligere tyder på forstyrrelse af cellecykluskontrol og genomisk stabilitet. Genomisk profilering indikerer, at HT-1197 tilhører en undergruppe af uroteliale kræftcellelinjer, der er præget af høj genomisk ustabilitet og molekylære træk, der stemmer overens med den mere aggressive, muskelinvasive undertype af blærekræft.

Væv	Urinblæren
Sygdom	Tilbagevendende blærekarcinom

Synonymer

- HT 1197
- HT1197
- HT 1197.T

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Tumorfremkaldende	Yeees; Ja, i mus og hamstere
Fordoblingstid	61 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

HT-1197 (Cytion katalognummer 305800)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1291

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Isoenzymer

G6PD, B

Mutationsprofil

Mutation: NRAS, simpel, p.Gln61Arg (c.182A>G), uspecificeret. Mutation, TERT, Simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), Uspecificeret, Note=I promoter. Mutation, TP53, Simple, p.His365Arg (c.1094A>G), uspecificeret

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase
Væskeudskiftning	to gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	44 år

Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Ansvarsfraskrivelse

Vores celler leveres udelukkende til in vitro-laboratorieforskningsformål og er ikke beregnet til klinisk eller diagnostisk brug, og de må heller ikke administreres til mennesker eller bruges til veterinære formål. Brugere skal overholde alle gældende retningslinjer og regler for håndtering og brug af disse celler i en forskningsmæssig sammenhæng.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes