HT-1197

305800

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

HT-1197 est une lignée cellulaire de carcinome urothélial humain établie à partir d'un carcinome à cellules transitionnelles de haut grade de la vessie chez un patient adulte de sexe masculin. Cette lignée provient d'une tumeur récurrente après de multiples résections chirurgicales et a montré un comportement clinique agressif avec des métastases étendues avant le décès du patient. Morphologiquement, les cellules HT-1197 présentent des caractéristiques épithéliales, notamment la présence de microvillosités, de tonofibrilles et de desmosomes observés au microscope électronique, ce qui indique leur origine épithéliale urothéliale. Ces cellules sont distinctes sur le plan caryotypique, avec des chromosomes marqueurs identifiables, et démontrent la capacité de croître dans une gélose molle, une caractéristique de la croissance indépendante de l'ancrage, et sont tumorigènes à la fois chez la souris nude et chez le hamster immunodéprimé.
Au niveau moléculaire, HT-1197 porte plusieurs mutations oncogéniques clés communément associées au cancer de la vessie. Il porte une mutation activatrice S249C dans le FGFR3 et une mutation E545K dans le PIK3CA, qui sont toutes deux répandues dans la pathogenèse du carcinome urothélial de la vessie. En outre, le HT-1197 présente une mutation Q61R dans le NRAS et des mutations dans la région du promoteur de TERT, ce qui suggère une capacité proliférative et une activité télomérase accrues. Le statut TP53 comprend une altération c.1094A>G, ce qui implique une perturbation du contrôle du cycle cellulaire et de la stabilité génomique. Le profilage génomique indique que HT-1197 appartient à un sous-ensemble de lignées cellulaires de cancer urothélial marquées par une forte instabilité génomique et des caractéristiques moléculaires compatibles avec le sous-type de cancer de la vessie le plus agressif et le plus invasif sur le plan musculaire.

Tissu	Vessie urinaire
Maladie	Carcinome récurrent de la vessie

Synonymes

- HT 1197
- HT1197
- HT 1197.T

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Tumorigène	Oui ; Oui, chez les souris et les hamsters
Temps de doublement	61 heures

IDENTIFIANTS

Référence

HT-1197 (numéro de catalogue 305800 de Cytion)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1291

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Isoenzymes

G6PD, B

Profil mutationnel

Mutation : NRAS, Simple, p.Gln61Arg (c.182A>G), Non spécifié. Mutation, TERT, Simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), Non spécifié, Note=Dans le promoteur. Mutation, TP53, Simple, p.His365Arg (c.1094A>G), Non spécifié

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

EMEM (MEM Eagle), w : 2 mM L-Glutamine, w : 2.2 g/L NaHCO3, w : EBSS (numéro d'article Cytion 820100a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase
Renouvellement des fluides	deux fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	44 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Avertissement

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique, ni à être administrées à des êtres humains ou utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les directives et réglementations applicables à la manipulation et à l'utilisation de ces cellules dans un cadre de recherche.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes