HT-1197

305800

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A HT-1197 egy humán urothelialis karcinóma sejtvonal, amelyet egy felnőtt férfi beteg magas fokú átmeneti hólyagsejtes karcinómájából hoztak létre. Ez a vonal egy többszörös sebészi eltávolítás után kiújuló tumorból származik, és a beteg halála előtt agresszív klinikai viselkedést és kiterjedt áttéteket mutatott. Morfológiailag a HT-1197 sejtek epiteliális jellegzetességeket mutatnak, beleértve a mikrovillák, tonofibrillumok és desmosomák jelenlétét, amint azt elektronmikroszkópiával megfigyelték, ami urotheliális epiteliális eredetükre utal. Ezek a sejtek kariotipikusan elkülönülnek, azonosítható marker kromoszómákkal, és képesek lágy agarban növekedni, ami a horgonyzás-független növekedés jellemzője, és mind meztelen egerekben, mind immunszupprimált hörcsögökben tumorogénnek bizonyulnak.
Molekuláris szinten a HT-1197 számos kulcsfontosságú onkogén mutációt tartalmaz, amelyek általában a hólyagrákhoz társulnak. Aktiváló S249C mutációt hordoz az FGFR3-ban és E545K mutációt a PIK3CA-ban, mindkettő gyakori az urotheliális hólyagrák patogenezisében. A HT-1197 emellett Q61R mutációval rendelkezik az NRAS-ban és mutációkkal a TERT promóter régiójában, ami fokozott proliferatív kapacitásra és telomeráz aktivitásra utal. A TP53 státusz c.1094A>G módosítást tartalmaz, ami a sejtciklus-szabályozás és a genomiális stabilitás zavarára utal. A genomikai profilalkotás azt jelzi, hogy a HT-1197 az urotheliális rákos sejtvonalak egy olyan alcsoportjába tartozik, amelyet magas genomiális instabilitás és a hólyagrák agresszívabb, izom-invazív altípusának megfelelő molekuláris jellemzők jellemeznek.

Szövet	Húgyhólyag
Betegség	Visszatérő hólyagrák

Szinonimák

- HT 1197
- HT1197
- HT 1197.T

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Daganatképző	Igen; Igen, egereknél és hörcsögöknél
Kettőzési idő	61 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

HT-1197 (Cytion katalógusszám: 305800)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_1291

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Izoenzimek

G6PD, B

Mutációs profil

Mutáció: Gln61Arg (c.182A>G), nem meghatározott. Mutáció: TERT, Simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), Meghatározatlan, Megjegyzés: a promóterben. Mutáció, TP53, Simple, p.His365Arg (c.1094A>G), Nem meghatározott

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion cikkszám: 820100a)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase
Folyadékcsere	hetente kétszer

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	44 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Sejtjeinket kizárólag in vitro laboratóriumi kutatási célokra bocsátjuk rendelkezésre, és nem szánjuk klinikai vagy diagnosztikai felhasználásra, nem adhatóak be embereknek, és nem használhatók fel állatorvosi célokra. A felhasználóknak be kell tartaniuk a sejtek kutatási környezetben történő kezelésére és felhasználására vonatkozó valamennyi vonatkozó irányelvet és előírást.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes