MES-SA

305827

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

MES-SA er en human uterinsarkomcellelinje som stammer fra pleuraeffusjonen til en voksen pasient med høygradig uterin leiomyosarkom. MES-SA er en modell for bløtvevssarkom, og den viser kjennetegn på mesenkymalt opphav, blant annet spindelformet morfologi og uttrykk for glatt muskelaktin. Cytogenetisk analyse av MES-SA avslører komplekse karyotypiske abnormiteter, inkludert flere numeriske og strukturelle kromosomforandringer. Det er viktig å merke seg at denne cellelinjen er mye brukt i studier av multiresistens og kjemoterapirespons, på grunn av dens dokumenterte følsomhet for doksorubicin og tilgjengeligheten av den medikamentresistente underlinjen, MES-SA/Dx5.
MES-SA har villtype p53 og retinoblastomprotein (Rb), noe som gjør den til et nyttig verktøy for å studere legemiddelrespons i p53-kompetente bakgrunner. I ulike funksjonelle genomikk- og proteomikkscreeninger har MES-SA vist konsistente mønstre av signaltransduksjonsveier, spesielt de som involverer PI3K/Akt- og MAPK-veiene. Revers-fase protein-array-profilering har bekreftet aktiviteten i disse signalveiene og avdekket proteinuttrykkssignaturer som er relevante for utforskning av målrettet terapi. Cellelinjen er dessuten inkludert i store farmakogenomiske ressurser som Cancer Cell Line Encyclopedia, der den har blitt brukt til integrerte analyser av medikamentfølsomhet, genetisk avhengighet og epigenetiske modifikasjoner.
Nyere undersøkelser av kromatintilstand og genregulering i MES-SA har avdekket epigenetiske sårbarheter, særlig når det gjelder metylering av promotorer og histonmodifikasjonsmønstre. MES-SA fungerer som et modellsystem i studier av histondeacetylasehemmere og midler som retter seg mot kromatinmodifikatorer. Dets inkludering i databaser for både omvendt fase-protein-array og DNA-metylering øker relevansen ytterligere i preklinisk legemiddelutvikling, spesielt for sarkomfokuserte behandlingsformer. Samlet sett utgjør MES-SA en robust og velkarakterisert plattform for å undersøke de molekylære forutsetningene for livmorsarkomer og for å evaluere terapeutiske strategier rettet mot mesenkymale svulster.

Vev	Livmoren
Sykdom	Sarkom i livmorkroppen

Synonymer

- MESSA

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Kvinne
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Fibroblast
Celletype	Epitel-lignende
Tumorinduserende	Ja; Ja, danner lett kolonier i myk agar. Ja, svulster utviklet seg i løpet av 21 dager med 100 % frekvens (5/5) i nakenmus inokulert subkutant med 10(7) celler.

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

MES-SA (Cytion-katalognummer 305827)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1404

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

Mutasjon: Gendelesjon, CDKN2A, homozygot. Mutasjon, ARID1A, Simple, p.Gly1610Trpfs*38 (c.4826dupC) (p.S1609fs) (c.4825_4826insC), Heterozygot (Cosmic-CLP=908127), ARID1A, Simple, p.Thr1690Asnfs*8 (c.5068dupA) (c.5067_5068insA), Heterozygot (Cosmic-CLP=908127), PTEN, Simple, p.His272Thrfs*4 (c.813delT) (p.Phe271fs) (c.811delT), Heterozygot (Cosmic-CLP=908127)

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

McCoys 5a, m: 3,0 g/L glukose, m: stabil glutamin, m: 2,0 mM natriumpyruvat, m: 2,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820200a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	56 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Ansvarsfraskrivelse

Cellene våre leveres utelukkende til in vitro-laboratorieforskningsformål og er ikke ment for klinisk eller diagnostisk bruk, og de skal heller ikke administreres til mennesker eller brukes til veterinærformål. Brukere må overholde alle gjeldende retningslinjer og forskrifter for håndtering og bruk av disse cellene i forskningssammenheng.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes