MES-SA

305827

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

MES-SA to ludzka linia komórek mięsaka macicy pochodząca z wysięku opłucnowego dorosłego pacjenta z mięsakiem gładkokomórkowym macicy o wysokim stopniu złośliwości. Jako model mięsaka tkanek miękkich, MES-SA wykazuje cechy pochodzenia mezenchymalnego, w tym morfologię wrzecionowatą i ekspresję aktyny mięśni gładkich. Analiza cytogenetyczna MES-SA ujawnia złożone nieprawidłowości kariotypowe, w tym liczne numeryczne i strukturalne zmiany chromosomalne. Co ważne, ta linia komórkowa jest szeroko stosowana w badaniach nad opornością wielolekową i odpowiedzią na chemioterapię, ze względu na jej udokumentowaną wrażliwość na doksorubicynę i dostępność jej lekoopornej podlinii, MES-SA/Dx5.
MES-SA wykazuje dziki typ p53 i białko retinoblastoma (Rb), co czyni go użytecznym narzędziem do badania odpowiedzi na leki w środowiskach kompatybilnych z p53. W różnych funkcjonalnych badaniach genomicznych i proteomicznych, MES-SA wykazał spójne wzorce zaangażowania szlaków transdukcji sygnału, szczególnie tych obejmujących szlaki PI3K/Akt i MAPK. Profilowanie białek w odwróconej fazie potwierdziło aktywność tych szlaków i ujawniło sygnatury ekspresji białek istotne dla poszukiwań terapii celowanej. Co więcej, linia komórkowa znajduje się w dużych zasobach farmakogenomicznych, takich jak Cancer Cell Line Encyclopedia, gdzie została wykorzystana do zintegrowanych analiz wrażliwości na leki, zależności genetycznych i modyfikacji epigenetycznych.
Niedawne badania stanu chromatyny i regulacji genów w MES-SA uwypukliły słabości epigenetyczne, w szczególności obejmujące metylację promotora i wzorce modyfikacji histonów. MES-SA służy jako modelowy system w badaniach inhibitorów deacetylazy histonowej i środków ukierunkowanych na modyfikatory chromatyny. Jego włączenie do baz danych zarówno macierzy białkowych w odwróconej fazie, jak i metylacji DNA, dodatkowo zwiększa jego znaczenie w przedklinicznym opracowywaniu leków, szczególnie w przypadku terapii ukierunkowanych na mięsaki. Łącznie, MES-SA zapewnia solidną i dobrze scharakteryzowaną platformę do badania molekularnych podstaw mięsaków macicy i oceny strategii terapeutycznych ukierunkowanych na guzy mezenchymalne.

Chusteczka	Macica
Choroba	Mięsak trzonu macicy

Synonimy

- MESSA

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Kobieta
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Fibroblast
Typ komórki	Podobny do nabłonka
Nowotworotwórczy	Tak; Tak, łatwo tworzą kolonie w miękkim agarze. Tak, guzy rozwinęły się w ciągu 21 dni ze 100% częstością (5/5) u nagich myszy zaszczepionych podskórnie 10(7) komórkami.

IDENTYFIKATORY

Źródło

MES-SA (numer katalogowy Cytion 305827)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1404

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Profil mutacji

Mutacja: Delecja genu, CDKN2A, Homozygotyczny. Mutacja, ARID1A, Simple, p.Gly1610Trpfs*38 (c.4826dupC) (p.S1609fs) (c.4825_4826insC), Heterozygotyczny (Cosmic-CLP=908127), ARID1A, Simple, p.Thr1690Asnfs*8 (c.5068dupA) (c.5067_5068insA), heterozygotyczny (Cosmic-CLP=908127), PTEN, Simple, p.His272Thrfs*4 (c.813delT) (p.Phe271fs) (c.811delT), heterozygotyczny (Cosmic-CLP=908127)

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

McCoys 5a, w: 3,0 g/l glukozy, w: stabilna glutamina, w: 2,0 mM pirogronianu sodu, w: 2,2 g/l NaHCO3 (numer artykułu Cytion 820200a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Accutase
Odnawianie płynów	2 do 3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C.
Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	56 lat
Pochodzenie etniczne	Kaukaski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Zastrzeżenie

Nasze komórki są dostarczane wyłącznie do celów badań laboratoryjnych in vitro i nie są przeznaczone do użytku klinicznego lub diagnostycznego, nie mogą być podawane ludziom ani wykorzystywane do celów weterynaryjnych. Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących wytycznych i przepisów dotyczących obchodzenia się z tymi komórkami i korzystania z nich w środowisku badawczym.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes