MOLM-16

305831

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

MOLM-16 es una línea celular de leucemia humana derivada de la sangre periférica de una mujer adulta con leucemia mieloide aguda mínimamente diferenciada (LMA-M0) en fase de recaída. Esta línea presenta un inmunofenotipo característico compatible con una leucemia de precursores mieloides/células asesinas naturales (NK), y expresa CD7, CD13, CD33, CD34 y CD56. Además, muestra características de diferenciación megacariocítica, evidenciadas por la expresión de marcadores como CD41, CD61, CD36, CD62P, CD110, CD151, trombospondina, factor de von Willebrand (vWF) y fibrinógeno. La presencia de peroxidasa plaquetaria en la envoltura nuclear, observada mediante microscopía electrónica, confirma aún más sus características de linaje megacarioblástico.
El MOLM-16 muestra un crecimiento dependiente de citocinas y responde a una serie de factores de crecimiento hematopoyéticos, entre los que se incluyen la eritropoyetina (EPO), el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), la interleucina-3 (IL-3), PIXY321 y la trombopoyetina (TPO). El análisis citogenético revela anomalías cariotípicas complejas, como t(6;8)(q21;q24.3) y t(9;18)(q13;q21), lo que indica inestabilidad genómica, común en la leucemia aguda. La línea celular carece de expresión de marcadores linfoides T y B, lo que concuerda con su perfil de precursor mieloide/NK, y es negativa para la actividad de la mieloperoxidasa (MPO), un rasgo característico de la LMA-M0. Debido a su combinación única de características mieloides, NK y megacariocíticas, MOLM-16 sirve como un valioso modelo in vitro para investigar la biología de la LMA mínimamente diferenciada, la megacariopoyesis y las vías de diferenciación leucémica.

Pañuelo de papel	Sangre periférica
Enfermedad	Leucemia mieloide aguda en adultos

Sinónimos

- MOLM16

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano
Sexo	Mujer
Propiedades de crecimiento	Suspensión
Nivel de bioseguridad	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de célula	De tipo epitelial
Tiempo de duplicación	aprox. 50-80 horas

IDENTIFICADORES

Referencia

MOLM-16 (número de catálogo de Cytion 305831)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_2120

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Perfil mutacional

Mutación: TP53, simple, p.Val173Met (c.517G>A), heterocigótica (Cosmic-CLP=1330948), TP53, simple, p.Cys238Ser (c.713G>C), heterocigótica (Cosmic-CLP=1330948)

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

RPMI 1640, con: 2,0 mM de glutamina estable, con: 2,0 g/L de NaHCO3 (número de artículo de Cytion 820700a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Complementar el medio con un 10% de FBS

Reactivo de disociación	Accutase
Densidad de siembra	De 1 a 3 x 10^4 células/cm^2
Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	77 años
Origen étnico	Japonés

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Aviso legal

Nuestras células se suministran exclusivamente con fines de investigación in vitro en laboratorio y no están destinadas a uso clínico o diagnóstico, ni deben administrarse a seres humanos ni utilizarse con fines veterinarios. Los usuarios deben cumplir todas las directrices y normativas aplicables para la manipulación y el uso de estas células en un entorno de investigación.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes