MOLM-16

305831

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

MOLM-16 ir cilvēka leikēmijas šūnu līnija, kas iegūta no pieaugušas sievietes perifērās asins, kurai bija recidīvs ar minimāli diferencētu akūtu mieloīdo leikēmiju (AML-M0). Šai līnijai piemīt raksturīgs imūnfenotips, kas atbilst mieloīdo/dabisko slepkavju (NK) prekursoru leikēmijai, un tā ekspresē CD7, CD13, CD33, CD34 un CD56. Turklāt tai piemīt megakariocītu diferenciācijas pazīmes, ko apliecina tādu marķieru ekspresija kā CD41, CD61, CD36, CD62P, CD110, CD151, trombospondīns, von Willebranda faktors (vWF) un fibrinogēns. Trombocītu peroksidāzes klātbūtne kodola apvalkā, kas novērota ar elektronu mikroskopiju, vēl vairāk apstiprina tās megakarioblastiskās ciltskoka īpašības. MOLM-16 parāda citokīnu atkarīgu augšanu un reaģē uz virkni hematopoētisko augšanas faktoru, tostarp eritropoetīnu (EPO), granulocītu-makrofāgu koloniju stimulējošo faktoru (GM-CSF), interleikīnu-3 (IL-3), PIXY321 un trombopoetīnu (TPO). Citogenētiskā analīze atklāj sarežģītas kariotipiskas anomālijas, piemēram, t(6;8)(q21;q24.3) un t(9;18)(q13;q21), kas norāda uz genomu nestabilitāti, kas ir raksturīga akūtai leikēmijai. Šajā šūnu līnijā nav T- un B-limfoīdo marķieru ekspresijas, kas atbilst tās mieloīdo/NK prekursoru profilam, un tā ir negatīva attiecībā uz mieloperoxidāzes (MPO) aktivitāti, kas ir AML-M0 raksturīga pazīme. Pateicoties unikālajai mieloīdo, NK un megakariocītu pazīmju kombinācijai, MOLM-16 kalpo kā vērtīgs in vitro modelis, lai pētītu minimāli diferencētas AML bioloģiju, megakariopoēzi un leikēmijas diferenciācijas ceļus.

Audums	Perifērās asinis
Slimība	Akūta mieloīdā leikēmija pieaugušajiem

Sinonīmi

- MOLM16

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Sieviete
Augšanas īpašības	Atsperes
Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Šūnu tips	Epitēlijveida
Laiks, kas nepieciešams, lai skaits dubultojās	aptuveni 50–80 stundas

IDENTIFIKATORI

Atsauce

MOLM-16 (Cytion kataloga numurs 305831)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_2120

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Mutāciju profils

Mutācija: TP53, vienkārša, p.Val173Met (c.517G>A), heterozigota (Cosmic-CLP=1330948), TP53, vienkārša, p.Cys238Ser (c.713G>C), heterozigota (Cosmic-CLP=1330948)

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Disociācijas reaģents	Accutase
Sēšanas blīvums	1 līdz 3 x 10^4 šūnas/cm^2
Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	77 gadi
Etniskā piederība	Japāņu

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Atbrīvojums no atbildības

Mūsu šūnas ir paredzētas tikai in vitro laboratorijas pētījumiem, un tās nav paredzētas klīniskai vai diagnostiskai lietošanai, tās nav ievadāmas cilvēkiem vai izmantojamas veterinārijā. Lietotājiem jāievēro visas piemērojamās vadlīnijas un noteikumi par šo šūnu apstrādi un izmantošanu pētniecībā.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes