NCI-H1734

305833

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az NCI-H1734 egy tüdőadenokarcinómából származó, humán nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) sejtvonal. A mellkasi rosszindulatú daganatokra összpontosító, kiterjedt NCI sejtvonal-program részeként hozták létre, és a tüdőrák biológiájával, valamint a terápiás válasszal kapcsolatos számos preklinikai vizsgálatban alkalmazták. Ez a sejtvonal KRAS-mutációt hordoz, amely jellemző egy olyan NSCLC-esetekből álló alcsoportra, amelyekről ismert, hogy rezisztenciát mutatnak az EGFR-gátlók iránt, valamint megváltozott választ adnak a MEK- és PI3K-útvonalakat célzó terápiákra. Molekuláris profilja miatt az NCI-H1734-et gyakran használják a KRAS által vezérelt tumorogenezis modellezésére, valamint a downstream jelátviteli kaszkádokat célzó vegyületek tesztelésére.
A fehérjeexpressziós elemzések, beleértve a reverzfázisú fehérje-mikroarrayeket (RPPA) is, kimutatták, hogy az NCI-H1734 jellegzetes foszforilációs mintázatot mutat, ami aktív PI3K/AKT- és MAPK-jelátvitelre utal. Ez értékes rendszerré teszi az onkogén jelátviteli dinamika és a gyógyszerre adott válasz vizsgálatához. A sejtvonal érzékenységet mutat az ezen útvonalak komponenseit célzó hatóanyagokra, beleértve a MEK-gátlókat is, és hasznos összehasonlítási alapként szolgál a KRAS-mutáns nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) modellek útvonalfüggőségét értékelő panelekben. Ezen felül szerepel olyan átfogó molekuláris adatbázisokban, mint a Cancer Cell Line Encyclopedia, és nagyszabású gyógyszerszűrési programok keretében is értékelték, hogy összefüggésbe hozzák a proteomikai és genomikai jellemzőket a farmakológiai profilokkal.
Szövettani szempontból az NCI-H1734 sejtek mirigyes epitheliális eredetű jellemzőket mutatnak, és in vitro adhezív monorétegben növekednek. Olyan tanulmányokban is szerepeltek, amelyek a tumor mikrokörnyezetével való kölcsönhatások és az epitheliális-mezenchimális átalakulás (EMT) terápiás rezisztenciára gyakorolt hatását vizsgálták. Az NCI-H1734 számos profilalkotó tanulmányba való bevonása növelte hasznosságát a nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) adenokarcinóma-altípusainak referencia-modelljeként, hozzájárulva a KRAS-mutáns tüdőrákokra vonatkozó precíziós onkológiai stratégiák kidolgozásához.

Szövet	Tüdő
Betegség	Tüdő adenokarcinóma

Szinonimák

- H1734
- H-1734
- NCIH1734

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelialis

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

NCI-H1734 (Cytion katalógusszám: 305833)

NCBI adóazonosító szám	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1491

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Mutációs profil

Mutáció: ATM, egyszerű, p.Gln65Pro (c.194A>C), heterozigóta, KRAS, egyszerű, p.Gly13Cys (c.37G>T), heterozigóta, RB1, egyszerű, p.Ser127Ile (c.380G>T), homozigóta, TP53, egyszerű, p.Arg273Leu (c.818G>T), homozigóta

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	56 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Sejtjeinket kizárólag in vitro laboratóriumi kutatási célokra bocsátjuk rendelkezésre, és nem szánjuk klinikai vagy diagnosztikai felhasználásra, nem adhatóak be embereknek, és nem használhatók fel állatorvosi célokra. A felhasználóknak be kell tartaniuk a sejtek kutatási környezetben történő kezelésére és felhasználására vonatkozó valamennyi vonatkozó irányelvet és előírást.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB