NCI-H1734

305833

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

NCI-H1734 je ľudská bunková línia nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) odvodená z adenokarcinómu pľúc. Bola vytvorená v rámci rozsiahleho programu bunkových línií NCI zameraného na malígne nádory hrudníka a bola využitá v širokej škále predklinických štúdií týkajúcich sa biológie rakoviny pľúc a terapeutickej odpovede. Táto bunková línia nesie mutáciu génu KRAS, čo je charakteristika, ktorá zodpovedá podskupine prípadov NSCLC, o ktorých je známe, že vykazujú rezistenciu voči inhibítorom EGFR a zmenené reakcie na terapie zamerané na signálne dráhy MEK a PI3K. Vďaka svojmu molekulárnemu profilu sa NCI-H1734 často používa na modelovanie tumorigenézy riadenej génom KRAS a na testovanie zlúčenín zameraných na kaskády signálnych dráh nižšej úrovne.
Analýzy expresie proteínov, vrátane proteínových čipov s reverznou fázou (RPPA), odhalili, že NCI-H1734 vykazuje charakteristický vzor fosforylácie, ktorý svedčí o aktívnej signalizácii PI3K/AKT a MAPK. Vďaka tomu sa stala cenným systémom na skúmanie dynamiky onkogénnej signalizácie a citlivosti na liečivá. Táto bunková línia vykazuje citlivosť na látky zamerané na zložky týchto signálnych dráh, vrátane inhibítorov MEK, a slúži ako užitočný komparátor v paneloch hodnotiacich závislosť od signálnych dráh v rámci modelov NSCLC s mutáciou KRAS. Okrem toho je zahrnutá v komplexných molekulárnych databázach, ako je napríklad Cancer Cell Line Encyclopedia, a bola vyhodnotená v rámci rozsiahlych projektov skríningu liekov s cieľom korelovať proteomické a genomické charakteristiky s farmakologickými profilmi.
Z histologického hľadiska vykazujú bunky NCI-H1734 charakteristiky žľazového epitelového pôvodu a in vitro rastú v adhezívnych monovrstvách. Boli zahrnuté do štúdií, ktoré skúmajú vplyv interakcií v mikroprostredí nádoru a epitelovo-mezenchýmovej transformácie (EMT) na terapeutickú rezistenciu. Zahrnutie línie NCI-H1734 do viacerých profilovacích štúdií zvýšilo jej využiteľnosť ako referenčného modelu pre podtypy adenokarcinómu v rámci NSCLC, čím prispelo k vývoju stratégií presnej onkológie pre rakoviny pľúc s mutáciou génu KRAS.

Tkanivo	Pľúca
Choroba	Adenokarcinóm pľúc

Synonymá

- H1734
- H-1734
- NCIH1734

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelové

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

NCI-H1734 (katalógové číslo Cytion 305833)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1491

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Mutčný profil

Mutácia: ATM, jednoduchá, p.Gln65Pro (c.194A>C), heterozygotná, KRAS, jednoduchá, p.Gly13Cys (c.37G>T), heterozygotná, RB1, jednoduchá, p.Ser127Ile (c.380G>T), homozygotná, TP53, jednoduchá, p.Arg273Leu (c.818G>T), homozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.
Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	56 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Upozornenie

Naše bunky sa poskytujú výlučne na účely laboratórneho výskumu in vitro a nie sú určené na klinické alebo diagnostické použitie, ani sa nemajú podávať ľuďom alebo používať na veterinárne účely. Používatelia musia dodržiavať všetky platné smernice a predpisy pre manipuláciu a používanie týchto buniek vo výskumnom prostredí.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB