NCI-H1734

305833

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

NCI-H1734 är en cellinje från icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos människa, som härrör från ett lungadenokarcinom. Den etablerades som en del av NCI:s omfattande cellinjeprogram med fokus på maligna tumörer i bröstkorgen och har använts i ett brett spektrum av prekliniska studier rörande lungcancerbiologi och terapeutiskt svar. Denna cellinje bär på en KRAS-mutation, en egenskap som överensstämmer med en undergrupp av NSCLC-fall som är kända för att uppvisa resistens mot EGFR-hämmare och förändrade svar på terapier riktade mot MEK- och PI3K-signalvägarna. På grund av sin molekylära profil används NCI-H1734 ofta för att modellera KRAS-driven tumörbildning och för att testa substanser som riktar sig mot nedströms signaleringskaskader.
Analyser av proteinexpression, inklusive reverse-phase protein arrays (RPPA), har visat att NCI-H1734 uppvisar ett tydligt fosforyleringsmönster som indikerar aktiv PI3K/AKT- och MAPK-signalering. Detta har gjort den till ett värdefullt system för att utforska onkogen signaleringsdynamik och läkemedelsrespons. Cellinjen uppvisar känslighet för substanser riktade mot komponenter i dessa signalvägar, däribland MEK-hämmare, och fungerar som en användbar jämförelse i paneler som utvärderar signalvägsberoende i olika KRAS-muterade NSCLC-modeller. Dessutom ingår den i omfattande molekylära datamängder, såsom Cancer Cell Line Encyclopedia, och har utvärderats i storskaliga läkemedelsscreeningar för att korrelera proteomiska och genomiska egenskaper med farmakologiska profiler.
Histologiskt uppvisar NCI-H1734-celler egenskaper som härrör från körtelepitel, och de växer i vidhäftande monolager in vitro. De har ingått i studier som undersöker hur interaktioner i tumörens mikromiljö och epitel-mesenkym-övergång (EMT) påverkar resistensen mot behandling. Att NCI-H1734 har inkluderats i flera profileringsstudier har ökat dess användbarhet som referensmodell för adenokarcinom-subtyper inom icke-småcellig lungcancer (NSCLC), vilket bidrar till utvecklingen av strategier för precisionsonkologi för KRAS-muterade lungcancrar.

Vävnad	Lungan
Sjukdom	Adenokarcinom i lungan

Synonymer

- H1734
- H-1734
- NCIH1734

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial

IDENTIFIERARE

Källa

NCI-H1734 (Cytion-katalognummer 305833)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1491

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Mutationsprofil

Mutation: ATM, enkel, p.Gln65Pro (c.194A>C), heterozygot, KRAS, enkel, p.Gly13Cys (c.37G>T), heterozygot, RB1, enkel, p.Ser127Ile (c.380G>T), homozygot, TP53, enkel, p.Arg273Leu (c.818G>T), homozygot

HANTERING OCH ODLING

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.
Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	56 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Ansvarsfriskrivning

Våra celler tillhandahålls uteslutande för in vitro-laboratorieforskning och är inte avsedda för klinisk eller diagnostisk användning, och de ska inte heller administreras till människor eller användas för veterinära ändamål. Användare måste följa alla tillämpliga riktlinjer och föreskrifter för hantering och användning av dessa celler i en forskningsmiljö.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes