NCI-H211

305837

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

NCI-H211 on inimese kopsuvähirakkude liin, mis on klassifitseeritud mitteväikerakk-kopsuvähiks (NSCLC). See on saadud täiskasvanud patsiendilt ja kuulub NCI-Navy Medical Oncology Branch'i poolt välja töötatud rindkere pahaloomuliste kasvajate mudelite paneeli. Rakuliin näitab in vitro epiteelimorfoloogiat ja adhesiivset kasvukäitumist, mis muudab selle sobivaks ühekihiliste kultuurisüsteemide jaoks. Seda hoitakse tavaliselt RPMI-1640 keskkonnas, millele on lisatud 10% loote veise seerumit, ja inkubeeritakse standardtingimustes (37 °C, 5% CO_2).

Molekulaarsel tasandil sisaldab NCI-H211 mutatsioone, mis on kooskõlas NSCLC patogeneesiga. Täpsemalt öeldes sisaldab see aktiveerivat KRAS-mutatsiooni, mis on kopsu adenokartsinoomide alarühma tunnusjoon, mis ajendab onkogeenset signaaliedastust MAPK ja PI3K/AKT signaaliteede kaudu. See mutatsioon aitab kaasa rakuliini resistentsusele teatud sihtterapiate, eriti EGFR-inhibiitorite suhtes, muutes selle samal ajal kasulikuks mudeliks KRAS-suunatud ravistrateegiate uurimiseks. Valgu tasandi profiili uuringud, näiteks need, kus kasutatakse pöördfaasi valgu massiive (RPPA), on tuvastanud NCI-H211 KRAS-mutantse kopsuvähi mudelite hulgas, millel on spetsiifilised signaalide sõltuvused, aidates kaasa biomarkereid ja ravisihte identifitseerida.

NCI-H211 on kasutatud suuremahulistes proteoomilistes ja farmakoloogilistes uuringutes ning ravimite tundlikkuse ja valgu ekspressioonimustrite hindamiseks. Need omadused muudavad selle efektiivseks mudeliks translatsioonilistes uuringutes, mis keskenduvad KRAS-i poolt põhjustatud NSCLC ravi lähenemiste arendamisele ja siht- ja tsütotoksiliste ravimitega seotud resistentsusmehhanismide uurimisele.

Kude	Metastaatiline
Haigus	Kopsu väikerakk-kartsinoom

Sünonüümid

- H211
- H-211
- NCIH211

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Naine
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Karyotüüp

Iso(3p), t(3;4)(pter-q12), t(3;11)(qter-p25)

TUNNUSED

Viide

NCI-H211 (Cytioni kataloginumber 305837)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_1529

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: TP53, lihtne, p.Arg248Gln (c.743G>A), täpsustamata (PubMed=1312696, PubMed=1565469)

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Puudub
Külvitihedus	0,1 kuni 1 x 10^6 rakku/ml
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	50 aastat

Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes