NCI-H211

305837

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

NCI-H211 je človeška pljučna karcinomska celična linija, ki je klasificirana kot nedrobnocelični pljučni rak (NSCLC). Izvira iz odraslega pacienta in je del panela modelov torakalnih malignomov, razvitih v okviru NCI-Navy Medical Oncology Branch. Celična linija kaže epitelno morfologijo in adhezivno rast in vitro, zaradi česar je primerna za enoplastne kultivne sisteme. Običajno se goji v mediju RPMI-1640, dopolnjenem z 10 % fetalnim govejim serumom, in inkubira v standardnih pogojih (37 °C, 5 % CO_2).
Na molekularni ravni NCI-H211 vsebuje mutacije, ki so skladne s patogenezo NSCLC. Natančneje, ima aktivirajočo mutacijo KRAS, značilno za podskupino pljučnih adenokarcinomov, ki spodbuja onkogeno signalizacijo prek poti MAPK in PI3K/AKT. Ta mutacija prispeva k odpornosti celične linije na določene ciljne terapije, zlasti na zaviralce EGFR, hkrati pa jo naredi uporaben model za preučevanje terapevtskih strategij, usmerjenih v KRAS. Študije profiliranja na ravni beljakovin, kot so tiste, ki uporabljajo reverzno fazno beljakovinsko matrico (RPPA), so NCI-H211 identificirale med modeli pljučnega raka z mutacijo KRAS s specifičnimi signalnimi odvisnostmi, kar pomaga pri identifikaciji biomarkerjev in terapevtskih ciljev.
NCI-H211 je bil predstavljen v obsežnih proteomskih in farmakoloških presejanjih in se je uporabljal za ocenjevanje občutljivosti na zdravila in vzorcev izražanja beljakovin. Te lastnosti ga naredijo učinkovit model za translacijsko raziskovanje, osredotočeno na razvoj pristopov zdravljenja za KRAS-pogojeni NSCLC in preučevanje mehanizmov odpornosti, povezanih s ciljnimi in citotoksičnimi sredstvi.

Tkivo	Metastatski
Bolezen	Drobnocelični karcinom pljuč

Sinonimi

- H211
- H-211
- NCIH211

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Kariotip

Iso(3p), t(3;4)(pter-q12), t(3;11)(qter-p25)

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

NCI-H211 (številka kataloga Cytion 305837)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1529

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Profil mutacij

Mutacija: TP53, preprosta, p.Arg248Gln (c.743G>A), nedoločena (PubMed=1312696, PubMed=1565469)

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Nič
Gostota setve	0,1 do 1 x 10^6 celic/ml
Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	50 let
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše celice so na voljo izključno za laboratorijske raziskave in vitro in niso namenjene za klinično ali diagnostično uporabo, niti jih ni dovoljeno dajati ljudem ali uporabljati v veterinarske namene. Uporabniki morajo upoštevati vse veljavne smernice in predpise za ravnanje in uporabo teh celic v raziskovalnem okolju.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes