NCI-H2110

305838

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A NCI-H2110 é uma linha celular humana de cancro do pulmão de células não pequenas (NSCLC) derivada de um adenocarcinoma do pulmão. Estabelecida como parte do painel do NCI-Navy Medical Oncology Branch, esta linha celular é amplamente utilizada para estudar a biologia do NSCLC e avaliar a eficácia de terapias direcionadas e citotóxicas. Cresce como uma monocamada epitelial aderente em condições padrão in vitro, normalmente cultivada em meio RPMI-1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino.
O perfil molecular da NCI-H2110 revelou uma mutação KRAS activadora, um fator oncogénico fundamental que promove a ativação constitutiva das vias de sinalização MAPK/ERK e PI3K/AKT. Este facto coloca a linha celular entre um subconjunto de modelos de CPNPC resistentes aos inibidores do EGFR, mas potencialmente sensíveis a terapias que visam os efectores a jusante da sinalização KRAS. O seu perfil de mutação e as dependências das vias fizeram da NCI-H2110 uma ferramenta valiosa nas análises farmacogenómicas, incluindo as que exploram a sensibilidade aos medicamentos em grandes painéis de linhas celulares, como a Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE). Para além da sua utilização em plataformas de rastreio de medicamentos, a linhagem NCI-H2110 tem sido utilizada em estudos transcriptómicos e epigenómicos que investigam a acessibilidade da cromatina, as modificações das histonas e os padrões de expressão genética. O seu historial genético bem caracterizado apoia estudos mecanicistas de resistência a inibidores da quinase e ajuda a elucidar o panorama molecular mais vasto dos adenocarcinomas do pulmão com mutações KRAS.

Tecido	Metastático
Doença	Carcinoma pulmonar de células não pequenas

Sinónimos

- H2110
- H-2110
- NCIH2110

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Não especificado
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de célula	De tipo epitelial

IDENTIFICADORES

Referência

NCI-H2110 (número de catálogo Cytion 305838)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1530

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Perfil mutacional

Mutação: RIT1, Simples, p.Met90Ile (c.270G>A), Heterozigótico.Mutação, TP53, Simples, p.Arg158Pro (c.473G>C), Homozigótico.

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase
Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	Idade não especificada

Etnia	Afro-americano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Aviso legal

As nossas células são fornecidas exclusivamente para fins de investigação laboratorial in vitro e não se destinam a utilização clínica ou de diagnóstico, nem devem ser administradas a seres humanos ou utilizadas para fins veterinários. Os utilizadores devem aderir a todas as diretrizes e regulamentos aplicáveis para o manuseamento e utilização destas células num ambiente de investigação.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes