NCI-H322

305839

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire NCI-H322 est une lignée cellulaire humaine de cancer du poumon à cellules non petites (CPNCP) dérivée d'un patient adulte atteint d'un carcinome bronchio-alvéolaire, un sous-type histologique de l'adénocarcinome. Cette lignée cellulaire a été établie par la Division d'oncologie médicale du NCI-Navy dans le cadre d'un effort global visant à générer des modèles de cancer du poumon annotés cliniquement à des fins de recherche et de développement thérapeutique. La lignée NCI-H322 présente une morphologie épithéliale adhérente in vitro et est généralement cultivée dans un milieu RPMI-1640 enrichi de 10 % de sérum fœtal bovin, dans des conditions standard de culture cellulaire.
Le profilage moléculaire de la lignée NCI-H322 révèle qu'elle porte une mutation du gène KRAS, qui contribue à la signalisation oncogénique par l'intermédiaire des voies MAPK/ERK et PI3K/AKT. Cette mutation rend la lignée cellulaire résistante aux thérapies ciblant l'EGFR et la rend appropriée pour des études axées sur l'adénocarcinome pulmonaire induit par KRAS. De plus, la lignée est de type sauvage pour l'EGFR et le gène TP53, offrant ainsi un contexte génétique bien défini pour l'analyse de la biologie tumorale dépendante de KRAS. Ses données transcriptionnelles et protéomiques ont été intégrées à des ensembles de données à grande échelle tels que la Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), où elles ont contribué à l'analyse des vulnérabilités spécifiques à la lignée cellulaire et des profils de réponse aux médicaments.
La lignée NCI-H322 a été largement utilisée dans le criblage pharmacologique et les études mécanistiques pour explorer la sensibilité aux inhibiteurs de MEK, aux inhibiteurs de la voie PI3K et aux agents chimiothérapeutiques. Ses performances constantes d'une étude à l'autre et son profil de mutations bien documenté en font un modèle préclinique précieux pour le CPNPC présentant une mutation du gène KRAS, ainsi qu'une référence clé dans les efforts visant à comprendre l'hétérogénéité tumorale et la résistance aux médicaments dans l'adénocarcinome du poumon.

Tissue	Poumon
Disease	Adénocarcinome pulmonaire avec approche mini-invasive

Synonyms

- H322
- H-322
- H322T
- NCI-H322T
- NCIH322T
- NCI-322
- NCIH322

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Cell type	Cellules du club
Doubling time	50

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

NCI-H322 (numéro de catalogue Cytion 305839)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1556

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutation : TP53, simple, p.Arg248Leu (c.743G>T), homozygote (PubMed=1311061, PubMed=1565469, PubMed=10536175, PubMed=20557307).

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, contenant 2,0 mM de glutamine stable et 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (numéro d'article Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	52 ans
Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu'on prévoit entreposer un cryotube dans de l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d'échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d'éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Disclaimer

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique; elles ne doivent pas non plus être administrées à des humains ni utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent respecter toutes les lignes directrices et tous les règlements applicables concernant la manipulation et l'utilisation de ces cellules dans un contexte de recherche.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes