NCI-H322

305839

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

NCI-H322 je celična linija človeškega nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC), pridobljena od odraslega bolnika z bronhioalveolarnim karcinomom, histološkim podtipom adenokarcinoma. To celično linijo je vzpostavil Oddelek za medicinsko onkologijo NCI-Navy kot del celovitih prizadevanj za ustvarjanje klinično opisanih modelov pljučnega raka za raziskave in terapevtski razvoj. NCI-H322 ima in vitro adherentno epitelijsko morfologijo in se običajno vzdržuje v gojišču RPMI-1640, dopolnjenem z 10 % fetalnega govejega seruma, pod standardnimi pogoji za gojenje celic.
Molekularno profiliranje NCI-H322 razkriva, da ima mutacijo KRAS, ki prispeva k onkogenemu signaliziranju prek poti MAPK/ERK in PI3K/AKT. Zaradi te mutacije je celična linija odporna na terapije, usmerjene na EGFR, in je primerna za študije, osredotočene na pljučni adenokarcinom, ki ga poganja KRAS. Poleg tega je linija divjega tipa za EGFR in TP53, kar ponuja določen genetski kontekst za raziskovanje biologije tumorjev, odvisnih od KRAS. Njeni transkripcijski in proteomski podatki so bili vključeni v obsežne zbirke podatkov, kot je Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), kjer je prispevala k analizam ranljivosti posameznih linij in vzorcev odziva na zdravila.
NCI-H322 se je pogosto uporabljala v farmakoloških presejalnih in mehanističnih študijah za raziskovanje občutljivosti na zaviralce MEK, zaviralce poti PI3K in kemoterapevtike. Zaradi svoje dosledne učinkovitosti v različnih študijah in dobro dokumentiranega profila mutacij je dragocen predklinični model za KRAS-mutantni NSCLC ter ključna referenca pri prizadevanjih za razumevanje heterogenosti tumorjev in odpornosti na zdravila pri pljučnem adenokarcinomu.

Tkivo	Pljuča
Bolezen	Minimalno invazivni pljučni adenokarcinom

Sinonimi

- H322
- H-322
- H322T
- NCI-H322T
- NCIH322T
- NCI-322
- NCIH322

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Moški
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Vrsta celice	Klubske celice
Čas podvojitve	50

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

NCI-H322 (kataloška številka Cytion 305839)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1556

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Profil mutacij

Mutacija: (PubMed=1311061, PubMed=1565469, PubMed=10536175, PubMed=20557307): TP53, Simple, p.Arg248Leu (c.743G>T), homozigotna.

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Accutase

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	52 let

Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše celice so na voljo izključno za laboratorijske raziskave in vitro in niso namenjene za klinično ali diagnostično uporabo, niti jih ni dovoljeno dajati ljudem ali uporabljati v veterinarske namene. Uporabniki morajo upoštevati vse veljavne smernice in predpise za ravnanje in uporabo teh celic v raziskovalnem okolju.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes