NCI-H69AR

305840

GENERAL INFORMATION

Description

La NCI-H69AR es un derivado multirresistente de la línea celular parental de carcinoma pulmonar de células pequeñas (SCLC) NCI-H69. Se desarrolló mediante una selección continua en concentraciones crecientes de agentes quimioterapéuticos, como la doxorrubicina. Como resultado, la NCI-H69AR sirve como un sistema modelo clave para investigar los mecanismos de resistencia adquirida a los fármacos en el SCLC. Esta línea celular conserva muchas de las características morfológicas y bioquímicas de su línea parental, pero muestra una resistencia profunda a varios agentes citotóxicos, lo que la hace especialmente relevante para estudiar las vías de resistencia mediadas por eflujo.
El mecanismo principal de resistencia en la NCI-H69AR implica la sobreexpresión de la proteína de resistencia a múltiples fármacos P-glicoproteína (P-gp), codificada por el gen MDR1. La P-gp funciona como una bomba de eflujo dependiente de ATP que reduce la acumulación intracelular de fármacos, particularmente de antraciclinas, alcaloides de la vinca y epipodofilotoxinas. Además, la línea NCI-H69AR presenta una expresión alterada de proteínas asociadas a la membrana, incluida la anexina II, lo que podría estar relacionado con cambios en la señalización del calcio y el tráfico vesicular —procesos implicados en la resistencia a los fármacos y la respuesta celular al estrés—. Estas alteraciones fenotípicas convierten a la línea NCI-H69AR en un modelo valioso para identificar moduladores de la resistencia a los fármacos y para evaluar la eficacia de agentes dirigidos a los mecanismos de eflujo o que eluden por completo las vías de resistencia. La línea NCI-H69AR también se ha utilizado en estudios comparativos con su línea parental para delinear cambios en la expresión génica y proteica, los perfiles de sensibilidad a los fármacos y la respuesta a inhibidores farmacológicos. Este marco comparativo ayuda a aclarar la evolución de la resistencia a los fármacos en el cáncer y contribuye al diseño de terapias combinadas destinadas a resensibilizar los tumores resistentes. La línea se cultiva típicamente en medio RPMI-1640 suplementado con suero fetal bovino y se mantiene en condiciones atmosféricas estándar. Su robustez y su fenotipo de resistencia bien caracterizado le han asegurado un lugar en la investigación preclínica sobre la resistencia a los medicamentos en el cáncer de pulmón.

Tissue	Metastático
Disease	Carcinoma pulmonar de células pequeñas
Metastatic site	Derrame pleural

Synonyms

- NCI-H69 AR
- NCI-H69/AR
- H69AR
- H-69AR

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Epithelial
Cell type	De tipo epitelial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumourigenic	Sí; Sí, en ratones nude

IDENTIFIERS

Citation

NCI-H69AR (número de catálogo de Cytion 305840)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_3513

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutación: PIK3CA, simple, p.Gly106_Arg108del (c.317_325delGGCAACCGT), heterocigótica (procedente de la línea celular parental).Mutación, RB1, simple, p.Glu748Ter (c.2242G>T), homocigótica (procedente de la línea celular parental).Mutación, TP53, simple, p.Glu171Ter (c.511G>T), homocigótica (procedente de la línea celular parental).

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 20 % de FBS

Dissociation reagent	Accutase
Fluid renewal	De 2 a 3 veces por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	55 años
Ethnicity	caucásico

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Disclaimer

Nuestras células se proporcionan exclusivamente con fines de investigación de laboratorio in vitro y no están destinadas a uso clínico ni diagnóstico, ni deben administrarse a seres humanos ni utilizarse con fines veterinarios. Los usuarios deben cumplir con todas las directrices y regulaciones aplicables para la manipulación y el uso de estas células en un entorno de investigación.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes