NCI-H69AR

305840

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

NCI-H69AR est un dérivé multirésistant de la lignée cellulaire parentale de carcinome pulmonaire à petites cellules (CPPC) NCI-H69. Elle a été développée par une sélection continue dans des concentrations croissantes d'agents chimiothérapeutiques tels que la doxorubicine. Par conséquent, NCI-H69AR sert de système modèle clé pour l'étude des mécanismes de résistance acquise aux médicaments dans le SCLC. Cette lignée cellulaire conserve de nombreuses caractéristiques morphologiques et biochimiques de sa lignée parentale, mais présente une résistance profonde à plusieurs agents cytotoxiques, ce qui la rend particulièrement pertinente pour l'étude des voies de résistance médiées par l'efflux.
Le principal mécanisme de résistance de NCI-H69AR implique la surexpression de la protéine de résistance multidrogue P-glycoprotéine (P-gp), codée par le gène MDR1. La P-gp fonctionne comme une pompe d'efflux ATP-dépendante qui réduit l'accumulation intracellulaire de médicaments, en particulier pour les anthracyclines, les alcaloïdes de la pervenche et les épipodophyllotoxines. En outre, NCI-H69AR présente une expression altérée des protéines associées à la membrane, y compris l'annexine II, qui peut être associée à des changements dans la signalisation calcique et le trafic vésiculaire - des processus impliqués dans la résistance aux médicaments et la réponse au stress cellulaire. Ces altérations phénotypiques font de NCI-H69AR un modèle précieux pour l'identification des modulateurs de la résistance aux médicaments et pour l'évaluation de l'efficacité des agents ciblant les mécanismes d'efflux ou contournant complètement les voies de résistance.
NCI-H69AR a également été utilisé dans des études comparatives avec sa lignée parentale pour délimiter les changements dans l'expression des gènes et des protéines, les profils de sensibilité aux médicaments et la réponse aux inhibiteurs pharmacologiques. Ce cadre comparatif aide à clarifier l'évolution de la résistance aux médicaments dans le cancer et contribue à la conception de thérapies combinées visant à resensibiliser les tumeurs résistantes. La lignée est généralement cultivée dans un milieu RPMI-1640 supplémenté en sérum bovin fœtal et maintenue dans des conditions atmosphériques standard. Sa robustesse et son phénotype de résistance bien caractérisé lui ont assuré une place dans la recherche préclinique sur la résistance aux médicaments dans le cancer du poumon.

Tissu	Métastatique
Maladie	Carcinome pulmonaire à petites cellules
Site métastatique	Épanchement pleural

Synonymes

- NCI-H69 AR
- NCI-H69/AR
- H69AR
- H-69AR

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	Épithéliale
Type de cellule	Comme l'épithélium

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumorigène	Oui ; Oui, chez les souris nues

IDENTIFIANTS

Référence

NCI-H69AR (numéro de catalogue Cytion 305840)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_3513

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Mutation : PIK3CA, Simple, p.Gly106_Arg108del (c.317_325delGGCAACCGT), Hétérozygote (à partir de la lignée cellulaire mère).Mutation, RB1, Simple, p.Glu748Ter (c.2242G>T), Homozygote (à partir de la lignée cellulaire mère).Mutation, TP53, Simple, p.Glu171Ter (c.511G>T), Homozygote (à partir de la lignée cellulaire mère).

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 20% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	55 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Avertissement

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique, ni à être administrées à des êtres humains ou utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les directives et réglementations applicables à la manipulation et à l'utilisation de ces cellules dans un cadre de recherche.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes