NCI-H69AR

305840

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

NCI-H69AR is een multiresistente afgeleide van de oudercellijn NCI-H69 van het kleincellig longcarcinoom (SCLC). Ze werd ontwikkeld door continue selectie in toenemende concentraties chemotherapeutische middelen zoals doxorubicine. Als gevolg hiervan dient NCI-H69AR als een belangrijk modelsysteem voor het onderzoeken van mechanismen van verworven geneesmiddelenresistentie in SCLC. Deze cellijn heeft veel van de morfologische en biochemische kenmerken van de ouderlijn, maar vertoont een hoge resistentie tegen verschillende cytotoxische middelen, waardoor deze bijzonder relevant is voor het bestuderen van efflux-gemedieerde resistentiewegen.
Het primaire mechanisme van resistentie in NCI-H69AR is overexpressie van het multidrug resistentie eiwit P-glycoproteïne (P-gp), dat gecodeerd wordt door het MDR1 gen. P-gp functioneert als een ATP-afhankelijke effluxpomp die de intracellulaire accumulatie van geneesmiddelen vermindert, met name voor anthracyclines, vinca-alkaloïden en epipodofyllotoxines. Daarnaast vertoont NCI-H69AR een veranderde expressie van membraangebonden eiwitten, waaronder annexine II, wat geassocieerd kan worden met veranderingen in calciumsignalering en vesiculaire transportprocessen die betrokken zijn bij geneesmiddelenresistentie en cellulaire stressrespons. Deze fenotypische veranderingen maken NCI-H69AR tot een waardevol model voor het identificeren van modulatoren van geneesmiddelenresistentie en voor het evalueren van de werkzaamheid van middelen die zich richten op effluxmechanismen of die de resistentiewegen helemaal omzeilen.
NCI-H69AR is ook gebruikt in vergelijkende studies met de ouderlijn om veranderingen in gen- en eiwitexpressie, geneesmiddelgevoeligheidsprofielen en respons op farmacologische remmers te bepalen. Dit vergelijkende kader helpt de evolutie van geneesmiddelenresistentie in kanker te verduidelijken en draagt bij aan het ontwerp van combinatietherapieën gericht op het opnieuw gevoelig maken van resistente tumoren. De lijn wordt gewoonlijk gekweekt in RPMI-1640 medium aangevuld met foetaal runderserum en onderhouden onder standaard atmosferische omstandigheden. De robuustheid en het goed gekarakteriseerde resistentiefenotype hebben ervoor gezorgd dat de lijn een belangrijke rol speelt in preklinisch onderzoek naar resistentie tegen geneesmiddelen in longkanker.

Weefsel	Uitgezaaid
Ziekte	Longkleincellig carcinoom
Plaats van uitzaaiingen	Pleurale effusie

Synoniemen

- NCI-H69 AR
- NCI-H69/AR
- H69AR
- H-69AR

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheel
Celtype	Epitheelachtig
Tumorverwekkend	Ja; Ja, in naakte muizen

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

NCI-H69AR (Cytion catalogusnummer 305840)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_3513

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Mutatieprofiel

Mutatie: PIK3CA, Eenvoudig, p.Gly106_Arg108del (c.317_325delGGCAACCGT), Heterozygoot (van ouder cellijn).Mutatie, RB1, Eenvoudig, p.Glu748Ter (c.2242G>T), Homozygoot (van ouder cellijn).Mutatie, TP53, Eenvoudig, p.Glu171Ter (c.511G>T), Homozygoot (van ouder cellijn).

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO_2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 20% FBS

Dissociatiereagens	Accutase
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	55 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Disclaimer

Onze cellen worden uitsluitend geleverd voor in vitro laboratoriumonderzoek en zijn niet bedoeld voor klinisch of diagnostisch gebruik, noch mogen ze worden toegediend aan mensen of worden gebruikt voor veterinaire doeleinden. Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften voor het hanteren en gebruiken van deze cellen in een onderzoeksomgeving.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes