NCI-H820

305841

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

NCI-H820 е човешка клетъчна линия за недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКБД), получена от белодробен аденокарцином на възрастен пациент. Тя е част от панела за рак на белия дроб на NCI и е широко използвана в изследванията на целеви терапии поради уникалните си генетични характеристики. Морфологично клетките имат епителни характеристики и растат като сраснати монослоеве. Обикновено се култивират в среда RPMI-1640, допълнена с 10% фетален говежди серум, и се поддържат при стандартни условия за клетъчна култура (37°C, 5% CO_2).
От генетична гледна точка NCI-H820 се отличава с това, че е носител на мутация на делеция на екзон 19 на EGFR (E746-A750del) - често срещана активираща мутация, свързана с чувствителност към тирозин киназните инхибитори на EGFR (TKI). Той обаче притежава и вторична мутация EGFR T790M, която е добре установен механизъм на придобита резистентност към ТКИ от първо поколение, като ерлотиниб и гефитиниб. Този двоен мутационен статус прави NCI-H820 изключително подходящ модел за изследване на механизмите на резистентност и за оценка на инхибитори на EGFR от трето поколение като osimertinib, които могат да преодолеят T790M-медиираната резистентност.
В допълнение към мутациите на EGFR, NCI-H820 е използван за изследване на автокринни сигнални цикли и рецепторни пътища на растежните фактори. Изследванията показват, че той експресира рецептор за инсулиноподобен растежен фактор тип I (IGF-1R), допринасящ за сигналите за оцеляване и пролиферация. Двойният му мутационен профил и експресията на рецепторни тирозин кинази го правят ценен инструмент в предклиничните проучвания, насочени към лекарствената резистентност, стратегиите за комбинирана терапия и разработването на персонализирани подходи за лечение на EGFR-мутирал NSCLC.

Тъкан	Метастатичен
Заболяване	Папиларен аденокарцином на белия дроб
Място на метастазите	Лимфен възел

Синоними

- H820
- H-820
- NCIH820

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Епителиален
Тип клетка	Подобни на епителните
Туморогенен	Да; при голи мишки

Кариотип

Почти триплоиден; модален брой = 69; диапазон = 46 до 74

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Време за удвояване	65

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

NCI-H820 (каталожен номер 305841 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1592

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Изоензими

AK-1, 1 ES-D, 1 G6PD, B GLO-I, 2 Me-2, 2 PGM1, 1 PGM3, 1

Мутационен профил

Мутация: TP53, проста, p.Thr284Pro (c.850A>C), хомозиготна

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 5% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase
Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	53 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Отказ от отговорност

Нашите клетки се предоставят изключително за целите на лабораторни изследвания in vitro и не са предназначени за клинична или диагностична употреба, нито да се прилагат на хора или да се използват за ветеринарни цели. Потребителите трябва да се придържат към всички приложими насоки и разпоредби за боравене и използване на тези клетки в изследователска среда.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes