NCI-H889

305842

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

NCI-H889 on ihmisen pienisoluinen keuhkosyöpä (SCLC) -solulinja, jolla on neuroendokriinisiä piirteitä. Se on peräisin aikuispotilaalta ja luokitellaan morfologisten ja molekyylisten kriteerien perusteella klassiseksi SCLC-malliksi. Solut kasvavat suspensiossa ja niillä on SCLC:lle tyypillinen pyöreä tai soikea morfologia. NCI-H889 ilmentää useita neuroendokriinisiä markkereita, ja sitä on käytetty laajasti tämän aggressiivisen keuhkosyövän alatyypin mekanistisissa ja farmakologisissa tutkimuksissa.
Toiminnallisesti NCI-H889:lle on ominaista autokriininen signalointi insuliinin kaltaisen kasvutekijän II (IGF-II) ja sen reseptorin IGF-R:n kautta. Vaikka IGF-I-mRNA:ta havaitaan laajalti keuhkosyöpäsolulinjoissa, IGF-I-proteiinin suora eritys on harvinaista; NCI-H889:ssä kasvun stimulaatioon osallistuva pääasiallinen ligandi on IGF-II. Tämä on yhdenmukaista havaintojen kanssa, jotka tukevat IGF-II/IGF-R-signaalikierron olevan avaintekijä autokriinisessä kasvussa SCLC-solulinjoissa. Nämä autokriiniset vuorovaikutukset tekevät NCI-H889:stä arvokkaan järjestelmän IGF-välitteisen mitogeenisen signalointiin ja sen terapeuttiseen häirintään liittyvien tutkimusten kannalta.
NCI-H889:n epigeneettiset analyysit ovat myös antaneet tietoa lääkevasteen säätelystä. Metylointiprofiili osoittaa muutoksia useissa geeneissä, jotka osallistuvat DNA-vaurion vasteeseen, solusyklin säätelyyn ja transkriptiotason säätelyyn. Esimerkiksi NCI-H889 on sisällytetty tutkimuksiin, jotka osoittavat erilaista metylaatiota ja ilmentymistä geeneissä, kuten SLFN11, joka liittyy herkkyyteen DNA:ta vaurioittaville aineille, ja EZH2, histonimetylaasi, jonka ilmentyminen on usein lisääntynyt SCLC:ssä. Nämä ominaisuudet yhdessä tekevät NCI-H889:stä merkittävän prekliinisen mallin neuroendokriinisten keuhkokasvainten terapeuttisten haavoittuvuuksien tutkimiseen.

Kudos	Metastaattinen
Sairaus	Keuhkojen pienisoluinen karsinooma
Metastaasikohde	Imusolmuke

Synonyymit

- H889
- H-889
- NCIH889

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Jousitus
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteeli
Solutyyppi	Epiteelin kaltainen

TUNNISTEET

Lähdeviite

NCI-H889 (Cytion-tuotenumero 305842)

NCBI-verotunnus	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1598

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Mutaatioprofiili

Mutaatio: TP53, yksinkertainen, p.Cys242Ser (c.725G>C), määrittelemätön (PubMed=1312696, PubMed=1565469).

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	69 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Vastuuvapauslauseke

Solujamme tarjotaan yksinomaan in vitro -laboratoriotutkimustarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu kliiniseen tai diagnostiseen käyttöön, eikä niitä saa antaa ihmisille tai käyttää eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin. Käyttäjien on noudatettava kaikkia sovellettavia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat näiden solujen käsittelyä ja käyttöä tutkimusympäristössä.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB